Exufiber® Ag+

Apósito de Fibras Gelificantes de PVA y Tecnología Hydrolock® y Acción Antimicrobiana

Optimizando el espacio donde ocurre la curación

- Exufiber® Ag + es una fibra de polivinilo de alcohol no tejida, el apósito se transforma en gel al contacto con exudado ayudándolo a adaptarse suavemente al lecho de la herida[1].
- En contacto con el líquido, Exufiber® Ag + libera iones de plata e inactiva una variedad de patógenos como bacterias, hongos y mohos, como se ha demostrado in vitro [6,7,8].
- Reduciendo el número de microorganismos, Exufiber® Ag + puede prevenir la reformación de biopelícula in vivo [9,10].



Absorbe y retiene el exudado, incluso bajo compresión, para reducir el riesgo de fugas y maceración [3]

Transfiere eficientemente el exudado del lecho de la herida al apósito secundario [3]

Puede prevenir la reformación de biopelículas [9,10]

Promueve el desbridamiento autolítico para mantener limpio el lecho de la herida al retirar el apósito [4,5]

Permanece intacto para una extracción de una pieza limpia y fácil [4,5]

LATEX

Mölnlycke®

Exufiber® Ag+

¿Cómo funciona Exufiber® Ag+?

Exufiber® Ag+ es un apósito de fibras de polivinilo de alcohol no tejido y estéril, más sulfato de plata. Es versátil de modo que puede utilizarlo para el tratamiento de numerosas heridas cavitadas y con exudado alto, como las úlceras del pie diabético o de la pierna, las úlceras por presión y heridas quirúrgicas que estén infectadas. Tiempo de uso indicado hasta 7 días.

Beneficios

Cuando Exufiber® Ag+ entra en contacto con el exudado de la herida, se convierte en un gel ayudando a crear el medio ambiente óptimo para la cicatrización.

Exufiber® Ag+ está indicado en un amplio rango de heridas con alto exudado infectadas o con riesgo de colonización, como úlceras de pie diabético o venosas; úlceras de presión; quemaduras de espesor parcial; heridas quirúrgicas y zonas donantes.

Precauciones

• Todas las heridas deben inspeccionarse con frecuencia. En caso de signos de infección clínica, consulte a un profesional de la salud para un adecuado tratamiento de la infección.
• Si el apósito se seca y es difícil de quitar, debe humedecerse de acuerdo con la práctica clínica y dejar en remojo hasta que se levanta fácilmente. Exufiber® Ag + puede tardar varios minutos en transformarse en un gel. Retire el apósito limpiando / enjuagando suavemente.

Composición de material del producto

Fibras de alcohol polivinílico (PVA), hidroxipropil celulosa y sulfato de plata equivalentes a 0,2 mg de plata por cm2.



Presentaciones Exufiber ® Ag+

Código	Tamaño (cm)	Unidad por caja	Registro Invima
603420	2 x 45	5	2019DM-0020271
603421	5 x 5	10	2019DM-0020271
603422	10 x 12	10	2019DM-0020271
603423	15 x 15	10	2019DM-0020271
603424	20 x 30	5	2019DM-0020271

Almacenamiento: Lugar limpio y seco
Metodo Esterilización: ETO
Procedencia: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Vigencia: 3 años
Certificaciones: ISO 9001, ISO 13485, CE 01965, AU Q00162

Referencias: 1. Mölnlycke Health Care. Lev-Tov H. A clinical investigation to study the effect of Exufiber Ag+ and other gelling fibre dressings on wound exudate and bioburden in medium to high exuding wounds. Mölnlycke Data on file, 2018. 2. Mölnlycke Health Care. Exufiber Ag+: Physical properties after 14 days test (Data on file, 2017.) 3. Mölnlycke Health Care. Exufiber Ag+: Physical properties over time (Mölnlycke data on file, 2019) 4. Mölnlycke Health Care. Exufiber Ag+: Competitor tests – Physical (Data on file, 2019) 5. Mölnlycke Health Care. Exufiber Ag+: Challenge Ag: Retention test on Aquacel competitors. (Data on file, 2016) 6. Mölnlycke Health Care. CE: Performance of Exufiber Ag+ in vitro; Antimicrobial effect, silver release kinetics and minimal effective concentration. (Data on file, 2016.) 7. Hamberg K., Gerner E. and Falkbring S., Mölnlycke Health Care, Gothenburg, Sweden. "Antimicrobial effect of a new silver-containing gelling fibre dressing against common wound pathogens". Poster presented at the Symposium on Advanced Wound Care Spring meeting/Wound Healing Society (WHS) Annual Meeting 2017, Apr 05 - 09, 2017, San Diego, CA, USA. 8. Hamberg K., Gerner E. and Falkbring S., Mölnlycke Health Care, Gothenburg, Sweden. "In vitro evaluation of the antimicrobial effect of silver-containing fibre dressings". Poster presented at the Symposium on Advanced Wound Care Spring meeting/Wound Healing Society (WHS) Annual Meeting 2017, Apr 05 - 09, 2017, San Diego, CA, USA. 9. Gil et al. 2017. Evaluation of a Gelling Fiber Dressing with Silver to Eliminate MRSA Biofilm Infections and Enhance the Healing. Poster presented at the Symposium on Advanced Wound Care Spring meeting/Wound Healing Society (WHS) Annual Meeting 2017, Apr 05 - 09, 2017, San Diego, CA, USA. 10. Davis, S. C., Li, J. , Gil, J. , Head, C. , Valdes, J. , Glinos, G. D., Solis, M. , Higa, A. and Pastar, I. (2019), Preclinical evaluation of a novel silver gelling fiber dressing on Pseudomonas aeruginosa in a porcine wound infection model. Wound Rep Reg, 27: 360-365. 11. Bjarnsholt T, Eberlein T, Malone M, Schultz G. Management of wound biofilm Made Easy. London: Wounds International 2017 12. McGrath A (2011) Overcoming the challenge of overgranulation. Wounds UK 7(1): 42–9. 13. Mölnlycke Health Care. Absorption of thick exudate Exufiber Ag+ vs. Aquacel Ag Extra. (Data on file, 2015.) 14. Mölnlycke Health Care. Exufiber Ag+ Wound Healing Study - Report (Data on file, 2015.)

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone + 46 31 722 30 00. The Mölnlycke, Exufiber, Mepilex, Safetac and Hydrolock trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies.© 2021 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved.

Mölnlycke®

Modo de uso Exufiber® Ag+

Limpiar la herida con solución salina o agua según el protocolo institucional. Seque bien la piel circundante.



Heridas superficiales:
Seleccione el tamaño de apósito apropiado. Para obtener los mejores resultados clínicos, asegúrese de que el producto cubra la herida y se superpone a los bordes. Retire el producto del empaque con técnica aséptica. El apósito se hincha, provocando la contracción de los bordes del apósito.



Heridas profundas y/o Cavitadas:
Coloque una cinta o mecha sin apretar en la herida para dejar espacio para que el apósito se hinche. Cuando utilice el apósito de cinta, córtelo a la longitud adecuada dejando un pequeño saliente de 2 a 3 cm fuera de la herida para facilitar su retiro. Cubra con un apósito secundario apropiado, la elección depende del nivel de exudado.



Heridas superficiales:
Fíjelas con un apósito secundario adecuado. La elección depende del nivel de exudado. La terapia de compresión se puede utilizar junto con Exufiber® Ag +. Heridas profundas y/o Cavitadas: Fíjelas (o cúbralas) con un apósito adhesivo o un vendaje, según corresponda.

www.molnlycke.lat

Crosswell de Colombia S.A.S.

Distribuidor Autorizado
CROSSWELL DE COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.968.509-6
Carrera 38 A No. 6-54 - Cali
Calle 125 No 21 A - 27 Oficina 301 - Bogotá
e-mail: servicioalcliente@crosswellcol.com