Fundación Social Castillo San Lucas
Huellas y Talentos

Carrera 10F Este # 20-96 sur Teléfono 8170040

ACTA: Socialización a Familias

FECHA: 18 Junio del 2026

NOMBRE DEL ACTA: Prevención, detención, notificación y manejo de Brotes de Enfermedades Transmisibles.

OBJETIVO: Dar a conocer a las Familias las orientaciones sobre acciones que deben implementar para prevenir, detectar, notificar, y manejar los brotes de enfermedades transmisibles en las niñas y los niños.

ALCANCE: Garantizar con las Familias participantes del Jardín Infantil Huellas y Talentos el cumplimiento del Protocolo para prevenir, detectar, notificar y manejar los brotes de enfermedades transmisibles en las niñas y los como medidas preventivas para evitar la propagación.

PROCEDIMIENTO: El día de hoy 18 de Junio del 2026 La Profesional en atención a la primera Infancia Yamile Rodelo de apoyo al componente de Bienestar Integral, socializa por medio de una cartelera informativa a las Familias el Protocolo para prevenir, detectar, notificar y manejar los brotes de enfermedades transmisibles en las niñas y los niños como medidas preventivas para evitar la propagación.

La información hace referencia a lo siguiente:

Que son Brotes y como se Manejan: Son enfermedades virales eruptivas, por eso en cualquier momento en el cuerpo de las niñas y los niños pueden aparecer paulatinamente manchitas rojas que indican la presencia de estas enfermedades y la necesidad de acudir al médico.

Powered by CamScanner

La varicela: Es una de las enfermedades contagiosas más comunes de la infancia, es causada por el virus de la varicela-zoster. La varicela se caracteriza por presentar un cuadro de fiebre acompañada por una erupción en la piel que consiste en puntos rojos que van transformando en pequeñas ampollitas o vesículas, apareciendo inicialmente en la piel del tronco y el cuero cabelludo y en el transcurso de 3 o 4 días se van esparciendo a la cara, brazos y piernas, producen mucho prurito o rasquiña, por lo que se debe tener cuidado en los niños y niñas de mantener las uñas cortas para evitar que se rasque y lesiones o infecte la piel. Estas vesículas se secan, se convierten en costras y después se curan sin dejar marca, pero si el niño o niña se rasca mucho y se infectan puede quedar una cicatriz. La fiebre puede aparecer incluso 1 o 2 días antes de que aparezca la erupción.

SARAMPION: ¿Cómo se presenta? • Inicia con fiebre, malestar general, catarro, ojos rojos (conjuntivitis), tos seca. Por lo general al tercer día aparece el brote que es muy menudo o pequeño y de color rojo (exantema) e inicia en la cara, posteriormente se extienden al tronco y extremidades. Es una enfermedad que tiene vacuna (vacuna triple vírica contra el sarampión, paperas y rubéola) y que se le administra a los doce meses de edad (primera dosis) y entre los 6 y 7 años (segunda dosis) ¿Cómo se transmite? • Al inhalar pequeñas gotas de secreciones persona enferma al hablar, toser o estornudar. Se puede transmitir desde tres días antes de iniciar la fiebre y la tos, y hasta cuatro días después de que aparecen el brote o exantema.

RUBEOLA: Es una enfermedad que se puede prevenir con la vacuna triple vírica, se considera benigna en los niños y se manifiesta con manchas pequeñas de color rosado en la cara, que van aumentando progresivamente por el resto del cuerpo, por lo cual se la puede confundir fácilmente con sarampión escarlatina. Para identificarla es necesario un examen de laboratorio. ¿Cómo se adquiere y cómo se manifiesta? • La transición de la enfermedad es por vía aérea; se requiere contacto directo entre una persona con la enfermedad y otra persona susceptible.

Powered by CamScanner

La contagiosidad se presenta aproximadamente una semana antes del brote y hasta 2 a 3 semanas después de haber iniciado ésta. Medida preventiva: • La prevención se basa primordialmente en la vacunación. La vacuna contra la rubéola generalmente se aplica en combinación con la vacuna contra el sarampión y las paperas. Se denomina vacuna MMR, y se debe administrar cuando el niño o la niña cumple el año de edad y después un refuerzo a los 5 años de edad.

ROSÉOLA: Si tu hijo queda expuesto a alguien con roséola y se infecta con el virus, la aparición de los signos y síntomas de infección, si es que aparecen, tarda generalmente una o dos semanas. Es posible infectarse con roséola y tener signos y síntomas demasiado leves como para percibirlos fácilmente Por lo general, la roséola comienza con una fiebre alta y repentina, a menudo mayor de 103 F (39,4 C). Durante la fiebre o antes, algunos niños también pueden tener un ligero dolor de garganta, goteo nasal o tos. Además de la fiebre, tu hijo también puede tener inflamación de los ganglios linfáticos del cuello. La fiebre dura de tres a cinco días. Erupción en la piel o sarpullido. Por lo general no siempre aparece un sarpullido una vez que la fiebre disminuye. El sarpullido consiste en muchas manchas o parches pequeños de color rosa, estas manchas son generalmente planas, pero algunas pueden ser elevadas; algunas manchas pueden tener un anillo blanco a su alrededor. Por lo general, el sarpullido aparece en el pecho, la espalda y el abdomen, y luego se extiende al cuello y los brazos.

ESCARLATINA: Es una enfermedad en la que aparece el brote después de una infección en la garganta. El niño puede manifestar además síntomas como fiebre, sudor, escalofríos, nauseas, vómito. También se forma una capa blanca sobre la lengua que desaparece después de unos días dejando la lengua de un color rojo brillante. Debe tratarse con penicilina, y el tratamiento debe durar mínimo 7 Días. Es importante que los padres sigan estrictamente las indicaciones médicas, aunque los síntomas desaparezcan, Después de 48 horas de haber comenzado con el

Powered by CamScanner

tratamiento, el niño puede seguir su vida normalmente. No es necesario aislarlo porque ya no hay riesgo de contagio. Se transmiten por contacto directo y por secreciones nasales y de garganta. Es importante aislar al niño, porque si se consideran benignas para los niños entre uno y 5 años de edad, pueden representar daños graves en mujeres embarazadas.

La Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituye un grupo de enfermedades de origen infeccioso que producen afección del aparato respiratorio y tienen una duración menor a 15 días. Esta puede ser causada por diversos agentes como virus, bacterias, hongos y parásitos.

La infección Diarreica Aguda (EDA) Es una infección del tracto gástrico e intestinal que puede ser causada por virus, bacterias o parásitos. En la mayoría de los casos se produce por virus que ingresan por la boca, inflamando la garganta. Luego son deglutidos al estómago y continúan su curso infeccioso hacia todo el intestino.

PARA EL MANEJO DE UN BROTE EN GENERAL SE RECOMIENDA TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS A NIVEL DE JARDINES INFANTILES:

Identificar los casos en la fase inicial: Para lo que se requiere que los cuidadores, padres, madres, acudientes y maestros, cuenten con la información y entrenamiento necesario para prevenir, detectar, notificar y Manejo cuándo se está presentando una situación de este tipo. Todo caso identificado debe ser aislado: – No recibir ningún niño – niña que haya sufrido el evento sin un certificado médico.

Powered by CamScanner


Fundación Social Castillo San Lucas
Huellas y Talentos

Carrera 10F Este # 20-96 sur Telófono
8170040

PREVENCION:

- ✓ Lavado Manos
- ✓ Aislamiento Respiratorio (uso Tapabocas.)
- ✓ Esquema Vacunas completos de acuerdo a la edad.
- ✓ Mantener el ambiente e instalaciones en correctas condiciones de aseo (Implementación Plan de Saneamiento)

PRESENTACION




Powered by CamScanner

Fundación Social Castillo San Lucas
Huellas y Talentos

Carrera 10F Este # 20-96 sur Teléfono
8170040

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:



Elaborado por:

Yamile Rodelo
profesional de atención a la primera infancia

v°b. Arelis Sáenz
Responsable del servicio

Powered by CamScanner

Fundación Social Castillo San Lucas
Huellas y Talentos

Carrera 10F Este # 20-96 sur Teléfono 5602790

Actividad Socialización a Familias sobre Prevención, Detención, Notificación y Manejo de Brotes de Enfermedades transmisibles.

Fecha Junio 18 / 2026 Nivel Todos

Nombre Del niño / niña	Nombre del Padre o acudiente
Thaylo David Barba salgado	Adriana Salgado
Jhon keyler ethavio Gonzalez	Tatiana Gonzalez
Yenny Valentina Gutierrez Diaz	Laura Diaz
Jeremy Joel Bozman Bustamante	Evelyn Bustamante
Liam Matthias Guevara Miranda	James Guevara
Kiara Liz Martinez Uribe	Daniela Uribe
Antonella Posada Zamora	Leniz Zamora
Liam Mathias Rodriguez M.	Nelly Katherine Rodriguez
Shon Esteban Rosales Morales	Dina Andrea Morales
Angel Miguel Torres Torres	Yoanna Torres
Juan Diego Useche Mendoza	Yoana Mendoza
Alessia Vega Villamizar	Karen Villamizar
Keiner Adrian Vasquez Alba	Andrea Alba
Victoria Ortiz salgado	Nuvia Ortiz V
Ethan Matias Buesaquillo	Erika Carolina Buesaquillo
Thiago Meneses Osorio	Bibiana Osorio Bedoya
Ethan Daniel Agudelo	Jennifer Agudelo
Hellen Gabriela Henao	Paola Tosse
Melanny Yizbeth Romero Reyes	Lina Alexandra Reyes
Thiago Estiven Gomez Salazar	Paola Salazar
Emma Celeste Barbosa	Billy Bernal
Max Gabriel Sabra P.	
Alan Joseth Hurtado R	Nuria Rodriguez
Zoe Naomi Bancancio silva	Diana Morela silva

Docentes Responsables: Yamile Rodela

Powered by CamScanner

Fundación Social Castillo San Lucas
Huellas y Talentos

Carrera 10F Este # 20-96 sur Teléfono 8170040

ACTA: Socialización a Colaboradoras y Colaboradores

FECHA: 18 Junio del 2026

NOMBRE DEL ACTA: Prevención, detención, notificación y manejo de Brotes de Enfermedades Transmisibles.

OBJETIVO: Dar a conocer a las y los Colaboradores las orientaciones sobre acciones que deben implementar para prevenir, detectar, notificar, y manejar los brotes de enfermedades transmisibles en las niñas y los niños.

ALCANCE: Garantizar con las y los colaboradores del Jardín Infantil Huellas y Talentos el cumplimiento para prevenir, detectar, notificar y manejar los brotes de enfermedades transmisibles en las niñas y los como medidas preventivas para evitar la propagación.

PROCEDIMIENTO: El día de hoy 18 de Junio del 2026 La Profesional en atención a la primera Infancia Yamile Rodelo de apoyo al componente de Bienestar Integral, socializa con las y los colaboradores(Profesionales y Auxiliares en Atención a la primera Infancia, Servicios generales y Personal de alimentos) por medio de una cartelera informativa para prevenir, detectar, notificar y manejar los brotes de enfermedades transmisibles en las niñas y los niños como medidas preventivas para evitar la propagación.

La información hace referencia a lo siguiente:

Que son Brotes y como se Manejan: Son enfermedades virales eruptivas, por eso en cualquier momento en el cuerpo de las niñas y los niños pueden aparecer paulatinamente manchitas rojas que indican la presencia de estas enfermedades y la necesidad de acudir al médico.

Powered by CamScanner

Fundación Social Castillo San Lucas
Huellas y Talentos

Carrera 10F Este # 20-96 sur Teléfono
8170040

La varicela: Es una de las enfermedades contagiosas más comunes de la infancia, es causada por el virus de la varicela-zoster. La varicela se caracteriza por presentar un cuadro de fiebre acompañada por una erupción en la piel que consiste en puntos rojos que van transformando en pequeñas ampollitas o vesículas, apareciendo inicialmente en la piel del tronco y el cuero cabelludo y en el transcurso de 3 o 4 días se van esparciendo a la cara, brazos y piernas, producen mucho prurito o rasquiña, por lo que se debe tener cuidado en los niños y niñas de mantener las uñas cortas para evitar que se rasque y lesiones o infecte la piel. Estas vesículas se secan, se convierten en costras y después se curan sin dejar marca, pero si el niño o niña se rasca mucho y se infectan puede quedar una cicatriz. La fiebre puede aparecer incluso 1 o 2 días antes de que aparezca la erupción.

SARAMPION: ¿Cómo se presenta? • Inicia con fiebre, malestar general, catarro, ojos rojos (conjuntivitis), tos seca. Por lo general al tercer día aparece el brote que es muy menudo o pequeño y de color rojo (exantema) e inicia en la cara, posteriormente se extienden al tronco y extremidades. Es una enfermedad que tiene vacuna (vacuna triple vírica contra el sarampión, paperas y rubéola) y que se le administra a los doce meses de edad (primera dosis) y entre los 6 y 7 años (segunda dosis) ¿Cómo se transmite? • Al inhalar pequeñas gotas de secreciones persona enferma al hablar, toser o estornudar. Se puede transmitir desde tres días antes de iniciar la fiebre y la tos, y hasta cuatro días después de que aparecen el brote o exantema.

RUBEOLA: Es una enfermedad que se puede prevenir con la vacuna triple vírica, se considera benigna en los niños y se manifiesta con manchas pequeñas de color rosado en la cara, que van aumentando progresivamente por el resto del cuerpo, por lo cual se la puede confundir fácilmente con sarampión escarlatina. Para identificarla es necesario un examen de laboratorio. ¿Cómo se adquiere y cómo se manifiesta? • La transición de la enfermedad es por vía aérea; se requiere contacto directo entre una persona con la enfermedad y otra persona susceptible.

Powered by CamScanner

La contagiosidad se presenta aproximadamente una semana antes del brote y hasta 2 a 3 semanas después de haber iniciado ésta. Medida preventiva: • La prevención se basa primordialmente en la vacunación. La vacuna contra la rubéola generalmente se aplica en combinación con la vacuna contra el sarampión y las paperas. Se denomina vacuna MMR, y se debe administrar cuando el niño o la niña cumple el año de edad y después un refuerzo a los 5 años de edad.

ROSÉOLA: Si tu hijo queda expuesto a alguien con roséola y se infecta con el virus, la aparición de los signos y síntomas de infección, si es que aparecen, tarda generalmente una o dos semanas. Es posible infectarse con roséola y tener signos y síntomas demasiado leves como para percibirlos fácilmente Por lo general, la roséola comienza con una fiebre alta y repentina, a menudo mayor de 103 F (39,4 C). Durante la fiebre o antes, algunos niños también pueden tener un ligero dolor de garganta, goteo nasal o tos. Además de la fiebre, tu hijo también puede tener inflamación de los ganglios linfáticos del cuello. La fiebre dura de tres a cinco días. Erupción en la piel o sarpullido. Por lo general no siempre aparece un sarpullido una vez que la fiebre disminuye. El sarpullido consiste en muchas manchas o parches pequeños de color rosa, estas manchas son generalmente planas, pero algunas pueden ser elevadas; algunas manchas pueden tener un anillo blanco a su alrededor. Por lo general, el sarpullido aparece en el pecho, la espalda y el abdomen, y luego se extiende al cuello y los brazos.

ESCARLATINA: Es una enfermedad en la que aparece el brote después de una infección en la garganta. El niño puede manifestar además síntomas como fiebre, sudor, escalofríos, nauseas, vómito. También se forma una capa blanca sobre la lengua que desaparece después de unos días dejando la lengua de un color rojo brillante. Debe tratarse con penicilina, y el tratamiento debe durar mínimo 7 Días. Es importante que los padres sigan estrictamente las indicaciones médicas, aunque los síntomas desaparezcan, Después de 48 horas de haber comenzado con el

Powered by CamScanner

tratamiento, el niño puede seguir su vida normalmente. No es necesario aislarlo porque ya no hay riesgo de contagio. Se transmiten por contacto directo y por secreciones nasales y de garganta. Es importante aislar al niño, porque si se consideran benignas para los niños entre uno y 5 años de edad, pueden representar daños graves en mujeres embarazadas.

La Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituye un grupo de enfermedades de origen infeccioso que producen afección del aparato respiratorio y tienen una duración menor a 15 días. Esta puede ser causada por diversos agentes como virus, bacterias, hongos y parásitos.

La infección Diarreica Aguda (EDA) Es una infección del tracto gástrico e intestinal que puede ser causada por virus, bacterias o parásitos. En la mayoría de los casos se produce por virus que ingresan por la boca, inflamando la garganta. Luego son deglutidos al estómago y continúan su curso infeccioso hacia todo el intestino.

PARA EL MANEJO DE UN BROTE EN GENERAL SE RECOMIENDA TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS A NIVEL DE JARDINES INFANTILES:

Identificar los casos en la fase inicial: Para lo que se requiere que los cuidadores, padres, madres, acudientes y maestros, cuenten con la información y entrenamiento necesario para prevenir, detectar, notificar y Manejo cuándo se está presentando una situación de este tipo. Todo caso identificado debe ser aislado: – No recibir ningún niño – niña que haya sufrido el evento sin un certificado médico.

Powered by CamScanner


Fundación Social Castillo San Lucas
Huellas y Talentos

Carrera 10F Este # 20-96 sur Teléfono
8170040

PREVENCION:

- ✓ Lavado Manos
- ✓ Aislamiento Respiratorio (uso Tapabocas.)
- ✓ Esquema Vacunas completos de acuerdo a la edad.
- ✓ Mantener el ambiente e instalaciones en correctas condiciones de aseo (Implementación Plan de Saneamiento)

PRESENTACION




Powered by CamScanner

Fundación Social Castillo San Lucas
Huellas y Talentos

Carrera 10F Este # 20-96 sur Teléfono
8170040

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS:



Elaborado por:

Yamile Rodelo
profesional de atención a la primera infancia

v°b. Arelis Sáenz
Responsable del servicio

Powered by CamScanner

Fundación Social Castillo San Lucas
Huellas y Talentos

Carrera 10F Este # 20-96 sur Teléfono 8170040

Fundación Social Castillo San Lucas

ACTIVIDAD: Socialización a colaboradores sobre Prevención, Detección, notificación y Manejo de Brotes de Enfermedades transmisibles.
FECHA:
RESPONSABLE: Yamile Pardo

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Patricia Rodriguez	profesional atención primera infancia	[illegible]
Angelica Gonzalez	Profesional en atención primera infancia	Angelica G
Nury Jimenez Padilla	profesional en atención a la primera infancia	Nury J
Maria Isabel Silva	Profesional en Atención a la primera infancia	Maria Isabel Silva
Magda Lorena Moreno R.	Profesional en atención a la primera infancia	Magda Lorena M.
Lina Fernanda Guerra	Auxiliar en atención a la primera infancia	LinaGuerra
Carlos Hernandez	Profesional en atención primera infancia	Carlos H
Ingrid Romero	S. Generales	Ingrid Romero
Amanda Morales C	S. Generales	Amanda MC
Valentina Morales	Auxiliar en Atención primera infancia	Valentina Morales
Fabian Hernandez	Personal de Alimentos	Fabian H.
Jhoanna Pardo	Servicios Generales	Jhoanna Pardo
Cristelys Palma	Personal de Alimentos	Cristelys Palma
Jenny Paola Bello	Personal de Alimentos	[illegible]

Powered by CamScanner

MANEJO DE BROTES

ENLA PRIMERA INFANCIA



Powered by CamScanner

QUE SON BROTES Y COMO SE MANEJAN

- Son enfermedades virales eruptivas, por eso en cualquier momento en el cuerpo de las niñas y los niños pueden aparecer paulatinamente manchitas rojas que indican la presencia de estas enfermedades y la necesidad de acudiral médico.



Powered by CamScanner

VARICELA



La varicela es una de las enfermedades contagiosas más comunes de la infancia, es causada por el virus de la varicela-zoster

La varicela se caracteriza por presentar un cuadro de fiebre acompañada por una erupción en la piel que consiste en puntos rojos que van transformando en pequeñas ampollitas o vesículas, apareciendo inicialmente en la piel del tronco y el cuero cabelludo y en el transcurso de 3 o 4 días se van esparciendo a la cara, brazos y piernas, producen mucho prurito o rasquiña, por lo que se debe tener cuidado en los niños y niñas de mantener las uñas cortas para evitar que se rasque y lesiones o infecte la piel. Estas vesículas se secan, se convierten en costras y después se curan sin dejar marca, pero si el niño o niña se rasca mucho y se infectan puede quedar una cicatriz. La fiebre puede aparecer incluso 1 o 2 días antes de que aparezca la erupción.

¿Qué tan contagiosa es la enfermedad? • La varicela es muy contagiosa, de hecho la probabilidad de contagio en el jardín infantil o en el hogar, cuando hay compañeros oun familiar enfermo es mayor a 90% cuando no se ha padecido o no se está vacunado.

Powered by CamScanner

SARAMPIÓN

¿Cómo se presenta? • Inicia con fiebre, malestar general, catarro, ojos rojos (conjuntivitis), tos seca. Por lo general al tercer día aparece el brote que es muy menudo o pequeño y de color rojo (exantema) e inicia en la cara, posteriormente se extienden al tronco y extremidades.

Es una enfermedad que tiene vacuna (vacuna triple vírica contra el sarampión, paperas y rubéola) y que se le administra a los doce meses de edad (primera dosis) y entre los 6 y 7 años (segunda dosis).

¿Cómo se transmite? • Al inhalar pequeñas gotas de secreciones expulsadas de una persona enferma al hablar,toser o estornudar. Se puede transmitir desde tres días antes de iniciar la fiebre y la tos, y hasta cuatro días después de que aparecen el brote o exantema.



Powered by CamScanner

RUBEOLA



Es una enfermedad que se puede prevenir con la vacuna triple vírica, se considera benigna en los niños y se manifiesta con manchas pequeñas de color rosado en la cara, que van aumentando progresivamente por el resto del cuerpo, por lo cual se la puede confundir fácilmente con sarampión escarlatina. Para identificarla es necesario un examen de laboratorio.

¿Cómo se adquiere y cómo se manifiesta? • La transición de la enfermedad es por vía aérea; se requiere contacto directo entre una persona con la enfermedad y otra persona susceptible. La contagiosidad se presenta aproximadamente una semana antes del brote y hasta 2 a 3 semanas después de haber iniciado ésta

Medida preventiva: • La prevención se basa primordialmente en la vacunación. La vacuna contra la rubéola generalmente se aplica en combinación con la vacuna contra el sarampión y las paperas. Se denomina vacuna MMR, y se debe administrar cuando el niño o la niña cumple el año de edad y después un refuerzo a los 5 años de edad.

Powered by CamScanner

ROSÉOLA

Si tu hijo queda expuesto a alguien con roséola y se infecta con el virus, la aparición de los signos y síntomas de infección, si es que aparecen, tarda generalmente una o dos semanas. Es posible infectarse con roséola y tener signos y síntomas demasiado leves como para percibirlos fácilmente


Por lo general, la roséola comienza con una fiebre alta y repentina, a menudo mayor de 103°F (39,4 C). Durante la fiebre o antes, algunos niños también pueden tener un ligero dolor de garganta, goteo nasal o tos. Además de la fiebre, tu hijo también puede tener inflamación de los ganglios linfáticos del cuello. La fiebre dura de tres a cinco días.

Erupción en la piel o sarpullido. Por lo general no siempre aparece un sarpullido una vez que la fiebre disminuye. El sarpullido consiste en muchas manchas o parches pequeños de color rosa, estas manchas son generalmente planas, pero algunas pueden ser elevadas; algunas manchas pueden tener un anillo blanco a su alrededor. Por lo general, el sarpullido aparece en el pecho, la espalda y el abdomen, y luego se extiende al cuello y los brazos. Es posible que en ocasiones llegue a las piernas y la cara.



Powered by CamScanner

Escarlatina




Es una enfermedad en la que aparece el brote después de una infección en la garganta. El niño puede manifestar además síntomas como fiebre, sudor, escalofríos, nauseas, vómito. También se forma una capa blanca sobre la lengua que desaparece después de unos días dejando la lengua de un color rojo brillante.

Se trata con penicilina y el tratamiento debe durar unos días. Es importante que los padres sigan estrictamente las indicaciones médicas aunque los síntomas desaparezcan después de 48 horas de haber comenzado con el tratamiento, el niño puede seguir su vida normalmente. No es necesario aislarlo porque ya no hay riesgo de contagio.

Se transmiten por contacto directo y por secreciones nasales y de garganta. Es importante aislar al niño, porque si se consideran benignas para los niños entre uno y 5 años de edad, pueden representar daños graves en mujeres embarazadas.

Powered by CamScanner




La Infección **Respiratoria Aguda** (IRA) constituye un grupo de **enfermedades** de origen infeccioso que producen afección del aparato **respiratorio** y tienen una duración menor a 15 días. Esta puede ser causada por diversos agentes como virus, bacterias, hongos y parásitos.

La infección **Diarreica Aguda** (EDA) Es una infección del tracto gástrico e intestinal que puede ser causada por virus, bacterias o parásitos. En la mayoría de los casos se produce por virus que ingresan por la boca, inflamando la garganta. Luego son deglutidos al estómago y continúan su curso infeccioso hacia todo el intestino.




Powered by CamScanner

PARA EL MANEJO DE UN BROTE EN GENERAL SE RECOMIENDA TOMAR LAS SIGUIENTES MEDIDAS A NIVEL DE JARDINES INFANTILES:



Identificar los casos en la fase inicial:
Para lo que se requiere que los cuidadores, padres, madres, acudientes y maestros, cuenten con la información y entrenamiento necesario para prevenir, detectar, notificar y manejo cuándo se está presentando una situación de este tipo.





Todo caso identificado debe ser aislado: – No recibir ningún niño – niña que haya sufrido el evento sin un certificado médico

PREVENCION:

- ✓ Lavado Manos
- ✓ Aislamiento Respiratorio (uso Tapabocas.)
- ✓ Esquema Vacunas completos de acuerdo a la edad.
- ✓ Mantener el ambiente e instalaciones en correctas condiciones de aseo (Implementación Plan de Saneamiento)

Powered by CamScanner