PROGRAMA DE CUIDADO A LA SALUD

GUÍA FARMACOLÓGICA

CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA

GRUPO 3

CENAIDA TIQUE GARCIA
Enfermero jefe

1. OBJETIVOS

1. Administrar medicamentos de forma segura y oportuna, asegurando el cumplimiento del tratamiento médico indicado, aplicando los 10 correctos para la administración segura de medicamentos y así minimizar posibles complicaciones medicamentosas en el participante.
2. acompañar al participante durante la toma de los medicamentos
3. Asegurar la administración de medicamentos por la vía indicada para producir el efecto requerido en el participante.
4. Proporcionar seguridad al participante con discapacidad y/o persona mayor, denunciando los posibles efectos secundarios en la administración de los medicamentos, mediante la utilización de los 10 correctos.
5. reportar oportunamente el desabastecimiento de medicamentos, para que simultáneamente se generen acciones con su entidad promotora de salud

2. Declaratoria de responsabilidad

En el centro integrarte atención interna grupo 3. La responsabilidad será del profesional de enfermería y del Técnico auxiliar de enfermería quien deberá ser capacitado frecuentemente y será objeto de seguimiento semanal por parte del profesional del servicio.

3. PRECAUCIONES y RECOMENDACIONES DE CARÁCTER OBLIGATORIO EN EL PROGRAMA DE CUIDADO A LA SALUD DEL CENTRO INTEGRARTE GRUPO 3 PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

- La administración de medicamentos estará a cargo en cada turno por dos auxiliares de enfermería, previamente capacitados por el jefe de enfermería y supervisados por el mismo,
- Recordar siempre los **diez correctos** en la administración segura de los medicamentos: (persona correcta, medicamento correcto, hora correcta, dosis correcta, vía correcta de administración, registrar todos los medicamentos administrados, informar e instruir sobre los medicamentos que está recibiendo, comprobar que la persona no toma ningún medicamento ajeno al prescrito, investigar si persona padece alergias y antes de preparar y administrar un medicamento realizar lavado de manos).
- Consultar al médico cuando una orden no sea clara.

- Tener en cuenta si la medicación debe retrasarse o adelantarse, en caso de citas médicas o para toma de exámenes y procedimientos.
- Mantener siempre los medicamentos multidosis perfectamente tapados, rotulados (con nombre completo del participante-cédula-FUID- fecha de inicio-fecha de terminación) y en las condiciones necesarias para su adecuada conservación.
- Evitar la administración de un medicamento cuyo olor o consistencia, se observe alterado.
- Evitar la administración simultanea de dos o más medicamentos, a menos que así este ordenado.
- Informar inmediatamente al jefe de enfermería, cualquier error en la administración del medicamento.
- Medir el medicamento en gotas o con jeringa para dar la cantidad exacta ordenada.
- Evitar realizar cualquier actividad diferente (hablar con alguien-escuchar música) u otra actividad concomitantemente durante la preparación de los medicamentos.
- Utilizar los principios de asepsia y antisepsia antes, durante y después de la preparación y administración de los medicamentos.
- Prepare el equipo requerido de acuerdo con el medicamento, la vía de administración y la tarjeta.
- Realizar anotación oportuna en el registro de medicamentos teniendo en cuenta: fecha y hora, Nombre del medicamento, dosis ordenada, Vía de administración y quien lo administra.
- Evite que las personas con discapacidad tengan acceso a los medicamentos que se dispensan.
- Registrar las novedades que se presenten durante la administración de medicamentos como efectos secundarios o reacciones adversas propias de la medicación, en el formato de registro de actividades diarias de cuidado a la salud. De ahí la importancia del conocimiento en farmacología
- Verificar y actualizar la formulación de los participantes.
- Realizar seguimiento en la administración de medicamentos,
- Realizar el registro y control del ingreso de medicamentos al programa en el formato establecido para tal fin.
- Informar oportunamente el desabastecimiento de medicamentos de los participantes
- Reportar al médico tratante cambios comportamentales en el participante, para ajustes de la medicación si es necesario

ACTIVIDAD

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS

1. Realizar la revisión semanal de tarjetas de administración de medicamentos, frente a la fórmula médica de cada participante (según sea el requerimiento)
2. Verificación de fórmulas médicas en conjunto con los medicamentos que son entregados, frente al formato de ingreso de medicamentos, todo debidamente registrado en el formato de Administracion de medicamentos

3. Alistar insumos necesarios para la preparación y dispensación de los medicamentos (bandejas-copas-cucharas medidoras-vasos-mezcladores-macerador-agua-jeringas-otros).
4. Realizar el lavado de manos, según protocolo institucional y hacer uso de los elementos de protección (guantes- gorro-tapabocas) para garantizar los principios de asepsia y antisepsia antes, durante y después de la preparación y administración de los medicamentos.
5. Depositar en cada copa (debidamente rotulada) los medicamentos que se entregarán al participante teniendo en cuenta los 10 correctos de la administración de medicamentos.
6. Mantener la bandeja de medicamentos en lugar seguro, lejos del acceso de los participantes, para evitar un incidente.
7. En la administración del medicamento, cerciórese de la identidad del participante llamado lo por su nombre completo verificando a quién se le va a administrar el medicamento.
8. Entregar la copa del participante con el medicamento en la mano o directamente en la boca, indicando que los tome y ofreciendo agua para facilitar la deglución.
9. Verificar la toma del medicamento, solicitando al participante la apertura de la boca.
10. Para los medicamentos de uso tópico o inhalado, se realiza la instrucción y asistencia de la respectiva forma de administración, aplicación y uso del mismo.
11. Al terminar la administración de medicamentos la bandeja y demás dispositivos utilizados se lavan se secan y se dejan limpios y en orden.
12. Durante la administración del medicamento, se debe realizar el registro en el formato de administración de medicamentos.
13. Clasificar los residuos de acuerdo a su disposición final según protocolo institucional
14. Si se presenta algún evento adverso, asociado a la administración de medicamentos, reportarlo según el programa de Farmacovigilancia del Centro.

ADMINISTRACIÓN VÍA ORAL

1. Colocarse los elementos de protección (guantes, gorro y tapabocas).
2. Realizar el lavado de manos, según protocolo institucional
3. Verifique el FUID, nombre completo del participante y foto, con el que se encuentra rotulada la lonchera de cada participante, donde se encuentran los medicamentos del mes.
4. Compare la etiqueta del medicamento con la tarjeta del participante y verifique 10 correctos.
5. En caso de medicamentos líquidos, tome la cantidad requerida en una jeringa para su medición exacta.
6. Posterior a la administración, verifique la toma del medicamento por parte del participante, (apertura de boca), y registre en la hoja de Formato Administración de Medicamentos
7. Clasificación de residuos para disposición final.

8. Si se presenta algún evento adverso, asociado a la administración de medicamentos, reportarlo según el programa de Farmacovigilancia del Centro

VÍA TÓPICA

1. Colocarse los elementos de protección (guantes, gorro y tapabocas)
2. Realizar el lavado de manos, según protocolo institucional
3. Verifique el FUID, nombre completo del participante y foto, con el que se encuentra rotulada la lonchera de cada participante, donde se encuentran los medicamentos del mes
4. Compare la etiqueta del medicamento con la tarjeta del participante y verifique 10 correctos.
5. Diríjase con el medicamento al lugar en donde se encuentra el participante para su respectiva administración según la vía ordenada
6. Explique el procedimiento, proporcione un ambiente privado, coloque al participante en posición cómoda y aplique el medicamento, según el requerimiento
7. Si es necesario lave la superficie de la piel donde se va a aplicar el medicamento, con agua y jabón a excepción que este contraindicado según las órdenes medicas dadas y por último seque con toalla de papel
8. Cubra la superficie de la piel si es necesario o según indicación médica.
9. Cuando el medicamento se aplica por primera vez, estar verificando si presenta reacción alérgica al mismo
10. Ubique el medicamento sobrante en la lonchera respectiva del participante, que está en el botiquín, para completar el tratamiento ordenado.
11. Después de la administración registre en la hoja de Formato Administración de Medicamentos Institucional.

VÍA OCULAR

1. Colocarse los elementos de protección (guantes, gorro y tapabocas)
2. Realizar el lavado de manos, según protocolo institucional
3. Verifique el FUID, nombre completo del participante y foto, con el que se encuentra rotulada la lonchera de cada participante, donde se encuentran los medicamentos del mes
4. Compare la etiqueta del medicamento con la tarjeta del participante y verifique 10 correctos.
5. Diríjase con el medicamento al lugar en donde se encuentra el participante para su respectiva administración según la vía ordenada
6. Explique el procedimiento, proporcione un ambiente privado, coloque al participante en posición cómoda y aplique el medicamento, según el requerimiento
7. Si el participante presenta secreción ocular en poca o gran cantidad, igual se debe limpiar la zona con solución salina normal al 0.9%, con ayuda de una gasa estéril.

8. Durante la administración del medicamento incline la cabeza del participante hacia atrás y pídale que mire hacia arriba
9. Con una mano sostenga el frasco gotero y con la otra mano se ayuda al participante a abrir el ojo, colocamos el frasco gotero a una distancia de + o - 4 cm por encima del globo ocular, exponga el saco conjuntival inferior, tirando levemente hacia abajo y deje caer el número de gotas según indicación médica
10. Pida al participante que después de que sienta caer las gotas cierre los ojos y los mueva suavemente hacia todas direcciones para que el medicamento sea absorbido correctamente
11. Limpie con un pañuelo el exceso del medicamento
12. Ubique el medicamento sobrante en la lonchera respectiva del participante, que está en el botiquín, para completar el tratamiento ordenado.
13. Después de la administración registre en la hoja de Formato Administración de Medicamentos Institucional.

GLOSARIO

1. **Acatisia:** La acatisia es un efecto adverso frecuente y molesto derivado del uso de muchos medicamentos antipsicóticos. Se caracteriza por inquietud y preocupación mental, la cual puede ser intensa. Se asocia con patrones de inquietud que incluyen el balanceo de un pie a otro, caminar en el mismo sitio mientras se está de pie, o mover una pierna sobre la otra mientras se está sentado
2. **Agranulocitosis**: Los glóbulos blancos combaten infecciones producidas por bacterias, virus, hongos y otros gérmenes. Un tipo importante de glóbulos blancos es el granulocito, el cual es producido en la médula ósea y viaja en la sangre a través de todo el cuerpo. Cuando los granulocitos perciben infecciones se juntan en los sitios de las infecciones y destruyen los gérmenes. Cuando el cuerpo tiene pocos granulocitos, la condición se llama agranulocitosis. Esto hace que sea más difícil para el cuerpo combatir los gérmenes. Como consecuencia, la persona está más inclinada a enfermarse de infecciones.
3. **Alopecia**: pérdida de pelo, normalmente en cuero cabelludo.
4. **Arritmia:** Una arritmia es cualquier trastorno en los latidos o el ritmo del corazón. Significa que el corazón late demasiado rápido o demasiado lento o que tiene un patrón irregular.
5. **Ataxia:** La ataxia describe una falta de control muscular o coordinación de los movimientos voluntarios, como caminar o levantar objetos. Como signo de una enfermedad no diagnosticada, la ataxia puede afectar varios movimientos y provocar dificultades para hablar, mover los ojos y tragar.
6. **Bradicardia:** Es un problema cardíaco, en el que el ritmo del corazón desciende. El corazón de un adulto debe latir entre 60 y 100 veces por minuto, cuando se está en total reposo. Al existir problemas de bradicardia, las palpitaciones son menores a 60, lo que supone un problema importante en el que el corazón no bombea la suficiente sangre rica en oxígeno, al resto de los tejidos.
7. **Diaforesis:** sudoración excesiva.
8. **Diplopía**: Visión doble.
9. **Disartria:** La disartria es un trastorno de la programación motora del habla. Los músculos de la boca, la cara y el sistema respiratorio se pueden debilitar, moverse con lentitud o no moverse en absoluto después de un derrame cerebral u otra lesión cerebral. El tipo y la gravedad de la disartria depende de qué parte del sistema nervioso se vea afectada.

10. **Enzima:** es una proteína natural que cataliza reacciones bioquímicas específicas, reacciones que sin la enzima se producirían demasiado lentamente o no se producirían. Cada enzima es muy específica de una reacción metabólica concreta. Por ejemplo, la uricasa actúa sobre el metabolismo del ácido úrico; la lactasa permite la absorción de la lactosa de la leche; la pepsina y tripsina la digestión de las proteínas; etc.
11. **Eosinofilia:** Disminución del porcentaje de Eosinófilos en sangre, un tipo de glóbulo blanco encargado de la respuesta inflamatoria en el cuerpo.
12. **Estatus epiléptico:** es una emergencia neurológica que requiere una atención inmediata. El diagnóstico y el tratamiento deben ser continuos a lo largo de los primeros minutos hasta su resolución. La causa más frecuente en participantes epilépticos es el cambio o el incumplimiento de la medicación y en los no epilépticos son las lesiones vasculares, traumáticas, tóxicas y metabólicas.
13. **Hematuria:** Registro de glóbulos rojos en orina, normalmente se conoce como sangre en orina.
14. **Hiperhidrosis:** La hiperhidrosis es la sudoración anormal y excesiva que no necesariamente está relacionada con el calor o el ejercicio.
15. **Hipocinesia:** Se caracteriza por una pérdida parcial o completa del movimiento muscular debido a un trastorno en el ganglio basal.
16. **Hiponatremia:** La hiponatremia es un desequilibrio electrolítico, con un nivel bajo de sodio en la sangre. El valor normal de sodio en los adultos es de 136 a 145 mEq/L. El sodio es un elemento, o electrolito de la sangre. El cloruro de sodio se conoce comúnmente como sal de mesa.
17. **Hipotensión:** La hipotensión es el nombre técnico de una baja presión arterial. Se produce cuando los latidos del corazón, encargados de bombear la sangre al resto del cuerpo, tienen un ritmo más lento de lo habitual. Por este motivo, ni el cerebro, ni el corazón ni el resto del organismo recibe la sangre necesaria, lo que puede dar lugar a mareos y desmayos.
18. **Histamina:** La histamina, una sustancia química presente en algunas células del organismo, provoca muchos de los síntomas de las alergias, como secreciones en la nariz o estornudos.
19. **Letargia:** es la pérdida temporal y completa de la sensibilidad y del movimiento por causa fisiológica, aún no identificada, haciendo que las funciones vitales de la persona que lo padece estén atenuadas de tal forma que parece que estén suspensas, dando al cuerpo la apariencia de muerte.
20. **Leucopenia:** La leucopenia expresa que tenemos pocos leucocitos en la sangre circulante, y ello puede ser debido porque se fabriquen mal, lo que puede suceder si la fábrica, la médula ósea del hueso, está dañada, por ej. por tóxicos, como puede ser el caso de quimioterapias agresivas, o exposición a radiaciones ionizantes.
21. **Linfopenia:** Afección por la que hay un número más bajo que lo normal de linfocitos (tipo de glóbulos blancos) en la sangre.
22. **Neurotransmisor:** también conocido como neuro mediador, es una sustancia química cuya principal función es la transmisión de información de una neurona a otra a travesando aquel espacio denominado como sináptico que separa dos neuronas consecutivas. De todas maneras, la información que transmite el neurotransmisor también puede llevarse a otras células como ser las musculares o glandulares; se trata de una pieza clave a la hora de la transmisión de los estímulos nerviosos. El neurotransmisor comienza actuar liberándose en la extremidad de una neurona, mientras se desarrolla la propagación del influjo nervioso, fijándose en los puntos precisos de la membrana de la neurona siguiente.
23. **Nistagmo:** El nistagmo es un movimiento involuntario, rápido y repetitivo de los ojos. Por lo general, el movimiento es de lado a lado (nistagmo horizontal), pero también puede ser hacia arriba y hacia abajo (nistagmo vertical) o circular (nistagmo rotatorio). El movimiento puede variar entre lento y rápido, y por lo general afecta a ambos ojos.
24. **Otalgia:** dolor de oído.
25. **Polifagia:** Se define la polifagia como el aumento patológico de la sensación de hambre y apetito que trae como consecuencia el exceso de la ingesta de nutrientes.
26. **Porfiria:** Las porfirias son un grupo de trastornos genéticos causados por problemas con la forma en que el cuerpo produce una sustancia llamada hemo. El hemo se encuentra en todo el cuerpo, especialmente en la sangre y en la médula ósea, donde transporta oxígeno.
27. **Serotonina:** La serotonina tiene un papel importante en el sistema nervioso central al ejercer una función de neurotransmisor. Por ello, ejerce como inhibidor en situaciones concretas en las que la persona experimenta un grado profundo de ira. También ejerce una función de inhibición del humor, el sueño, el apetito y la sexualidad.

28. **Sialorrea:** La sialorrea es una patología ocasionada por la incapacidad de retener la saliva dentro de la boca y su progresión al tracto digestivo. Conocida además como babeo, no se debe a una alta producción de saliva, sino a una alteración en su procesamiento.
29. **Steven-Johnson**: El síndrome de Stevens-Johnson es un trastorno grave y extraño de la piel y de las membranas mucosas. Por lo general, es una reacción a un medicamento o una infección. A menudo, comienza con síntomas similares a la influenza, seguidos por una erupción dolorosa de color rojo o morado que se expande y forma ampollas. Luego, la capa superior de la piel afectada se muere, se desprende y después se cura.
30. **Trombocitopenia:** La trombocitopenia es una enfermedad en la que manifiestas un recuento bajo de plaquetas. Las plaquetas (trombocitos) son células sanguíneas incoloras que ayudan a la sangre a coagular. Las plaquetas detienen el sangrado aglutinando y formando tapones en las lesiones de los vasos sanguíneos.
31. **Xerostomía:** es un trastorno grave y extraño de la piel y de las membranas mucosas. Por lo general, es una reacción a un medicamento o una infección. A menudo, comienza con síntomas similares a la influenza, seguidos por una erupción dolorosa de color rojo o morado que se expande y forma ampollas. Luego, la capa superior de la piel afectada se muere, se desprende y después se cura.

GUIA DE MEDICAMENTOS

PRESENTACIÓN

SERTRALINA

Comprimidos 50mg

INDICACIONES

Es un medicamento antidepresivo que potencia el efecto de la serotonina (hormona de la felicidad), regulando el ánimo de la persona y favoreciendo su autoestima, relajación y satisfacción. Actúa directamente en el sistema nervioso central. Utilizado en depresión mayor, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico y ansiedad.

CONTRAINDICACIONES

- Sensibilidad al medicamento.
- Precaución en casos de falla hepática.
- Continua observación en participantes diabéticos

EFECTOS SECUNDARIOS

- Palpitaciones cardíacas.
- Cambios de peso, polifagia.
- Sedación, confusión, dolor en el pecho, mialgias.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ✔ Realizar monitoreo constante de signos vitales.
- ✔ Realizar valoración del sistema cardiovascular, de manera que se detecten posibles riesgos.

- ✔ Tener precaución con una posible sobredosificación, de ser así, remita al centro de salud más cercano.
- ✔ Determinar si se presentan cambios de peso en la persona con discapacidad, que puedan asociarse con el uso del medicamento.

PRESENTACIÓN

HALOPERIDOL

Solución oral-gotas

INDICACIONES

Es un medicamento antipsicótico. Funciona en receptores del cerebro, modula la conducta. Utilizado en casos de delirio, manía, estados de agitación y psicosis. Se usa también para el control motor y control de los tics vocales. Útil para el manejo de vómito y náuseas.

CONTRAINDICACIONES

- NO usar cuando la persona ya esté sedada.
- Hipersensibilidad o alergia conocida al medicamento.
- Precaución en casos de falla hepática.
- Continua observación si se está utilizando depresores del Sistema Nervioso Central (SNC).

EFECTOS SECUNDARIOS

- Xerostomía
- Aumento de la salivación
- Visión borrosa, pérdida del apetito, estreñimiento, diarrea, acidez estomacal.
- Insomnio, hipocinesia o adinamia

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ✔ Vigilar constantes vitales, sedación, y efectos extrapiramidales (temblor, comúnmente).
- ✔ Motivar y tener el participante ocupado, para evitar el aislamiento y sedentarismo.
- ✔ Vigilar los momentos de aparición de estados de depresión.
- ✔ Precaución con la hipotensión ortostática (Enseñar al participante a levantarse de la silla de manera progresiva).
- ✔ Vigilar posible congestión nasal y sequedad de boca. Insistir en correcta higiene bucodental.
- ✔ Vigilar signos de sobredosis como: arritmia cardíaca, depresión respiratoria, alteración de la coordinación motora, letargo y nistagmo.
- ✔

PRESENTACIÓN

CARBAMAZEPINA

Suspensión- tabletas de 200mg

INDICACIONES

Es un medicamento anticonvulsivante. Se encarga de bloquear los canales por los cuales se trasmite el sodio, importante en la conducción de las neuronas. Controla la actividad eléctrica neuronal. Útil el tratamiento de la epilepsia refractaria. En ocasiones usado para el manejo de trastornos bipolares.

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en personas con discapacidad que puedan presentar falla hepática o renal.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Mareo, ataxia, somnolencia y fatiga
- Dolor de cabeza, diplopía.
- Alteraciones cutáneas, urticaria
- Disminución de glóbulos blancos y plaquetas
- Náusea, vómito, xerostomía, aumento de peso
- Hiponatremia.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ✔ Realizar monitoreo continuo de los signos vitales de la persona con discapacidad.
- ✔ En los tratamientos largos debe monitorearse la densidad ósea debido a que puede producir osteoporosis y fracturas.
- ✔ Vigilar alteraciones visuales y tener precaución al momento de las movilizaciones para evitar caídas.
- ✔ El enfermero (a) debe estar pendiente de las erupciones cutáneas para determinar reacciones alérgicas y suspender de inmediato.
- ✔ Vigilar aparición de signos de ideación y comportamiento suicida, remitir de inmediato a consulta para valoración por neurología y psiquiatría.

PRESENTACIÓN

ACIDO VALPROICO

Cápsulas 250mg- suspensión oral

INDICACIONES

Es un medicamento anticonvulsivante. Se encarga de estabilizar las neuronas y actividad eléctrica evitando su hiperexcitación. Se utiliza normalmente para el manejo de convulsiones tónico-clónicas, aunque demuestra efecto en casos de dolor neuropático o para manejo de estado de manía y depresión

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en casos de falla hepática o renal.

Procurar su administración durante o después de los alimentos para favorecer su absorción

EFECTOS SECUNDARIOS

- Erupciones cutáneas
- Síndrome de Stevens Johnson
- Ideaciones suicidas
- Somnolencia
- Mareos

- Alteraciones visuales
- Disminución de la capacidad de reacción
- Falla renal o hepática y cambios en los niveles de electrolitos en sangre.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ✔ Por riesgo de toxicidad hepática el enfermero debe asegurar que en los controles por medicina y psiquiatría, se tengan en cuenta las concentraciones de enzimas hepáticas, renales y electrolitos.
- ✔ Vigilar aparición de hematomas, sangrados espontáneos, debido a alteración hematológica.
- ✔ Vigilar la aparición de signos de ideación y comportamiento suicida.
- ✔ Monitorear la ganancia de peso por encima del 20% del peso al inicio del tratamiento y dar aviso para control médico.

PRESENTACIÓN

LEVETIRACETAM

Tabletas 500mg- Suspensión oral

INDICACIONES

Es un medicamento anticonvulsivante. Se encarga de liberar el calcio dentro de las neuronas para disminuir la excitación de neurotransmisores. Utilizado normalmente para manejo de epilepsia.

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en personas con falla hepática o renal.
- Puede exacerbar la ideación suicida

EFECTOS SECUNDARIOS

- Nasofaringitis
- Anorexia, irritabilidad y depresión
- Somnolencia, fatiga
- Náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal
- Trastorno del equilibrio, mareo y vértigo
- Dolor de cabeza
- Convulsiones

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ✔ Control constante de signos vitales.
- ✔ El enfermero debe mantener indicios sobre comportamientos suicidas, se han presentado casos de suicidios.
- ✔ El tratamiento debe suspenderse paulatinamente.
- ✔ Vigilar la función renal del participante que lleva largo tratamiento.
- ✔ Es necesario toma de cuadro hemático para identificar alteraciones en glóbulos blancos y plaquetas.
- ✔ Vigilar la recurrencia de infecciones y la presencia de hemorragias espontáneas.

PRESENTACIÓN

FLUOXETINA

Tabletas 25-100mg

INDICACIONES

Es un medicamento antidepresivo que funciona a nivel del sistema nervioso central (SNC), regulando la actividad de la Serotonina (hormona de la felicidad). Sus usos comprenden tratamiento para: depresión mayor, trastorno obsesivo compulsivo, y manejo profiláctico de dolores musculares y migraña.

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en personas con diagnósticos de epilepsia, diabetes mellitus o insuficiencia hepática.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Inquietud motora.
- Ansiedad
- Dificultad para hablar o tragar
- Sialorrea
- Cambio en el apetito
- Vómito
- Estreñimiento
- Hiperhidrosis
- Trastornos de sueño

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ✔ Realizar control constante de signos vitales.
- ✔ Evitar sobredosificación o administración concomitante con otros psicofármacos. Contribuye a la aparición de convulsiones.
- ✔ Hacer seguimiento de función renal y hepática.
- ✔ Vigilar el estado nutricional produce pérdida de peso.
- ✔ Favorecer la disminución de los niveles de ansiedad en la persona con discapacidad.

PRESENTACIÓN

CLONAZEPAM

Tableta 2 mg - Solución oral

INDICACIONES

Es un medicamento cuyo mecanismo de acción se centra en un efecto de sedación y relajación producido a nivel del sistema nervioso central (SNC), de manera que se reduce la excitación de la actividad cerebral, y con ello, controla las convulsiones mioclónicas refractarias. Es un potente anticonvulsivante, aunque también es utilizado para el manejo de ataques de pánico, síndrome de las piernas inquiatas y algunos casos de agitación psicomotora, ya que induce sedación.

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en personas con falla hepática.
- Precauciones en personas con diagnóstico de Glaucoma.
- Precaución si se usa con otros depresores del sistema nervioso central o medicamentos que a su vez induzcan sedación.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Mareo, ataxia, somnolencia, fatiga, temblores, disartria, letargo.
- Dolor de cabeza, visión doble, otalgia, visión borrosa
- Dificultad respiratoria, epistaxis, tos.
- Espasmos musculares, dolor articular
- Cambios de comportamiento

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ✔ Mantener la cabeza elevada de 30 a 45 grados y en orientación frontal.
- ✔ Control de signos vitales, especialmente saturación de oxígeno.
- ✔ Alertar sobre la necesidad de vigilar la aparición de comportamiento de autoagresión.
- ✔ Observación constante del estado anímico.
- ✔ Precaución con las sobredosificaciones.

PRESENTACIÓN

AMITRIPTILINA

Tableta 25 mg

INDICACIONES

Es un medicamento antidepresivo que funciona a nivel del sistema nervioso central (SNC), regulando la actividad de la Serotonina (hormona de la felicidad). Sus usos comprenden tratamiento para: depresión mayor, trastorno de pánico o fobias, y manejo profiláctico de dolores musculares y migraña

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en personas con falla hepática o renal.
- Precauciones en personas con diagnóstico de Glaucoma.
- Precaución en personas con antecedentes cardiovasculares, hipotiroidismo o epilepsia

EFECTOS SECUNDARIOS

- Mareo, somnolencia moderada.
- Fatiga, ansiedad.
- Disminución de la capacidad cognitiva.
- Alucinaciones, confusión o desorientación.
- Cambios de comportamiento.
- Adormecimiento de músculos, debilidad o temblores

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ✔ Realizar control constante de signos vitales.
- ✔ Hacer seguimiento de función renal y hepática.
- ✔ Favorecer la disminución de los niveles de ansiedad en la persona con discapacidad.
- ✔ Tener en cuenta el riesgo de caída si se presenta inestabilidad o debilidad muscular.

- ✔ Precaución cuando se presenten cambios de comportamiento, remitir a psicología y psiquiatría cuando se requiera.

PRESENTACIÓN

QUETIAPINA

Tableta 25-100-200-300 mg

INDICACIONES

Es un medicamento antipsicótico que regula los neurotransmisores que actúan en el cerebro, modulando el comportamiento. Está indicado para el tratamiento de: esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar en fase maníaca

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Iniciar el tratamiento en dosis bajas para evitar hipotensión ortostática.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Mareo, somnolencia moderada.
- Fatiga, ansiedad.
- Aumento de peso.
- Alucinaciones, confusión o desorientación.
- Cambios de comportamiento.
- Aumento de apetito, xerostomía

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ✔ Realizar control constante de signos vitales.
- ✔ Favorecer la disminución de los niveles de ansiedad en la persona con discapacidad.
- ✔ Realizar valoración de estado nutricional, pues se pueden presentar cambios de peso.

PRESENTACIÓN

LEVOMEPROMAZINA

Tableta 25-100 mg

INDICACIONES

Es un medicamento antipsicótico que regula los niveles de Dopamina, que actúan en el cerebro, modulando el comportamiento. Está indicado para el tratamiento de: Ansiedad de cualquier etiología, agitación psicomotora, estados depresivos, psicosis aguda y crónica, trastornos del sueño, algias graves

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.

- Precaución en adultos mayores o personas con antecedentes cardiovasculares.
- Realizar chequeo hemático.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Mareo, somnolencia moderada.
- Ansiedad.
- Aumento de peso.
- Retinopatía.
- Cambios de comportamiento.
- Fotosensibilidad.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ✔ Realizar control constante de signos vitales.
- ✔ Favorecer la disminución de los niveles de ansiedad en la persona con discapacidad.
- ✔ Realizar valoración de estado nutricional, pues se pueden presentar cambios de peso.
- ✔ No administrar junto con otros psicofármacos. Administrar por lo menos 30 minutos antes o después de otros medicamentos.

PRESENTACIÓN

RISPERIDONA

Comprimido 1-2-3 mg

INDICACIONES

Es un medicamento antipsicótico que regula los de Dopamina y Serotonina (hormona de la felicidad), modulando el comportamiento. Está indicado para el tratamiento de: esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar en fase maníaca, agresión persistente en participante con demencia,

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en personas con antecedente de Evento Cerebrovascular (ECV).

EFECTOS SECUNDARIOS

- Mareo, somnolencia moderada.
- Ansiedad.
- Acatisia, Discinesia, Distonía.
- Cambios de comportamiento.
- Insomnio, depresión.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ✔ Realizar control constante de signos vitales.
- ✔ Favorecer la disminución de los niveles de ansiedad en la persona con discapacidad.
- ✔ No administrar a la vez con otros psicofármacos.
- ✔ Remitir a psicología y psiquiatría cuando se requiera en caso de cambios bruscos de comportamiento.

PRESENTACIÓN

OLANZAPINA

tableta 2.5 - 5mg

INDICACIONES

Es un medicamento antipsicótico que regula los niveles de Dopamina y Serotonina (hormona de la felicidad), modulando el comportamiento. Está indicado para el tratamiento de: esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar en fase maníaca, agresión persistente en participante con demencia

CONTRAINDICACIONES

- · Alergia al medicamento.
- · Se formula en casos de agranulocitosis ocasionada por Clozapina.
- · Precaución en personas con diagnóstico de epilepsia; puede aumentar convulsiones.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Eosinofilia, neutropenia, leucopenia
- Fatiga, somnolencia, ansiedad.
- Aumento de peso y de apetito
- Bradicardia o taquicardia.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- ➢ Realizar control constante de signos vitales.
- ➢ Favorecer la disminución de los niveles de ansiedad en la persona con discapacidad.
- ➢ No administrar a la vez con Carbamazepina.
- ➢ Remitir a psicología y psiquiatría cuando se requiera en caso de cambios bruscos de comportamiento.
- ➢ Procurar controles rutinarios por medicina o psiquiatría con el fin de realizar chequeo continuo de células sanguíneas.
- ➢ Realizar valoración del estado nutricional pues se pueden presentar cambios de peso.

PRESENTACIÓN

FENITIONA

tableta 100mg

INDICACIONES

Es un medicamento anticonvulsivante. Se encarga de modular los niveles de Sodio en las neuronas para disminuir la excitación de neurotransmisores. Utilizado normalmente para manejo de epilepsia, también

tiene efecto como antiarrítmico. supraventricular, manejo del dolor neuropático y migraña. Sus principales usos son: manejo y prevención de convulsiones tónico clónicas, control de taquicardia

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en personas con antecedentes cardiovasculares.
- Precaución en personas con falla hepática.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Nistagmos, ataxia, disartria.
- Vómito, náusea, estreñimiento.
- Somnolencia, fatiga

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Realizar control constante de signos vitales.
- Tener presente el riesgo de caída debido a los efectos secundarios del medicamento.
- No administrar a la vez con otros psicofármacos.
- Favorecer controles médicos periódicos, más aún si la persona con discapacidad tiene factores de riesgo cardiovasculares.

PRESENTACIÓN

FENOBARBITAL

tableta 50 - 100mg

INDICACIONES

Es un medicamento anticonvulsivante del grupo de los barbitúricos. Se encarga de inhibir la transmisión del impulso nervioso entre las neuronas. Utilizado normalmente para manejo de epilepsia, también tiene efecto como antiarrítmico. Sus principales usos son: manejo de epilepsia y otros estados convulsivos. Tiene efecto como sedante o hipnótico.

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento y otros barbitúricos.
- Precaución en personas con falla hepática.
- Puede generar dependencia física y psicológica

EFECTOS SECUNDARIOS

- Agitación, confusión, ansiedad.
- Vómito, náusea, estreñimiento.

- Somnolencia, fatiga.
- Hipoventilación o apneas.
- Bradicardia, hipotensión o síncope

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Realizar control constante de signos vitales.
- Remitir a psicología o psiquiatría si se presentan cambios bruscos de comportamiento.
- No administrar a la vez con otros psicofármacos, especialmente Ácido Valproico.
- Favorecer controles médicos periódicos, más aún si la persona con discapacidad tiene factores de riesgo cardiovasculares.

PRESENTACIÓN

TRAZODONA

tableta 50mg

INDICACIONES

Es un medicamento antidepresivo que funciona a nivel del sistema nervioso central (SNC), regulando la actividad de la Serotonina (hormona de la felicidad). Sus usos comprenden tratamiento para: episodios de depresión mayor, estados mixtos de depresión y ansiedad, con o sin insomnio, tratamiento de otros insomnios, ataques de pánico y fobias. Como antidepresivo es menos potente que la Fluoxetina.

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en personas con falla hepática.
- No utilizar en personas en proceso de recuperación de Infarto Agudo del Miocardio, pues la Trazodona produce arritmias cardíacas.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Agitación, confusión, ansiedad.
- Vómito, náusea, estreñimiento.
- Somnolencia, fatiga.
- Hipoventilación o apneas.
- Bradicardia, hipotensión o síncope

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Realizar control constante de signos vitales.
- Remitir a psicología o psiquiatría si se presentan cambios bruscos de comportamiento.

- No administrar a la vez con otros psicofármacos, especialmente Ácido Valproico.
- Favorecer controles médicos periódicos, más aún si la persona con discapacidad tiene factores de riesgo cardiovasculares.

PRESENTACIÓN

LORAZEPAM

tableta 1 - 2mg

INDICACIONES

Es un medicamento cuyo mecanismo de acción se centra en un efecto de sedación y relajación producido a nivel del sistema nervioso central (SNC), de manera que se reduce la excitación de la actividad cerebral y el impulso neuronal. Es utilizado para el manejo de depresión, ansiedad generalizada, estados psicóticos, ansiedad reactiva. Usado también para manejo de abstinencia alcohólica, manejo de insomnio por ansiedad y algunos estados epilépticos.

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en personas con falla hepática.
- Precaución si se usa con otros depresores del sistema nervioso central o medicamentos que a su vez inducen sedación.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Mareo, ataxia, somnolencia, fatiga, temblores, disartria, letargo.
- Dolor de cabeza, debilidad severa.
- Trombocitopenia, pancitopenia, agranulocitosis.
- Hipotensión, bradicardia.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Mantener la cabeza elevada 30 a 45 grados y en orientación frontal .
- Control de signos vitales, especialmente saturación de oxígeno.
- Procurar controles rutinarios por medicina y psiquiatría debido a posibles cambios hematológicos. Garantizar toma de laboratorios.
- Observación constante del estado anímico.
- Precaución con las sobredosificaciones.

PRESENTACIÓN

TOPIRAMATO

Tabletas 25 - 50 - 100MG

INDICACIONES

Es un medicamento anticonvulsivante. Su mecanismo de acción no está claramente definido, pero parece encargarse de inhibir la transmisión del impulso nervioso entre las neuronas. Utilizado normalmente para manejo de epilepsia, también tiene efecto como antiarrítmico. Sus principales usos son: manejo de epilepsia y algunos espasmos musculares. Produce efecto diurético.

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en personas con falla hepática.
- Precaución en personas con falla renal o cálculos renales debido a que se disminuye la eliminación del fármaco y favorece la acumulación en el organismo.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Ataxia, somnolencia, fatiga, .
- Pérdida de peso.
- Xerostomía y diaforesis.
- Leucopenia y hematuria.
- Aumenta en 2% la probabilidad de que se presenten cálculos renales.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Control diario de constantes vitales.
- Realizar valoración nutricional debido a que se pueden presentar cambios de peso.
- Procurar controles rutinarios por medicina y psiquiatría debido a posibles cambios hematológicos. Garantizar la toma de laboratorios.
- Favorecer el libre desplazamiento de la persona con discapacidad y reducción del riesgo de caída.

PRESENTACIÓN

LACOSAMIDA

Tabletas 50 - 100M - 200 mg

INDICACIONES

Es un medicamento anticonvulsivante. Se encarga de modular los niveles de Sodio en las neuronas para disminuir la excitación de neurotransmisores. Utilizado normalmente para manejo de epilepsia y crisis epilépticas.

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en personas con antecedentes cardiovasculares debido a que aumenta riesgo para desarrollar bloqueos auriculoventriculares.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Ataxia, somnolencia, fatiga, .
- Deterioro de la memoria, trastornos cognitivos.
- Xerostomía.
- Nistagmo, disartria.
- Alteraciones gastrointestinales (náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento).

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Control diario de constantes vitales.
- Procurar controles rutinarios por medicina debido a riesgo cardiovascular.
- Remitir a psicología o psiquiatría en caso de que se presenten cambios bruscos de comportamiento.

PRESENTACIÓN

OMEPRAZOL

Tabletas 20MG

INDICACIONES

Es un protector gástrico que actúa sobre la bomba de protones (Sodio-Potasio), inhibiendo la producción de ácido gástrico en el estómago. Está indicado para el tratamiento de: gastritis crónica, úlcera gástrica, úlcera duodenal, infección por Helicobacter Pylori, esofagitis y reflujo gastroesofágico.

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en personas con ayuno prolongado (auscultar para verificar peristaltismo), pues puede generarse Íleo paralítico.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Urticaria, eritema, alopecia .
- Mareo, náuseas, epigastralgia.
- Alteraciones gastrointestinales (vómito, diarrea, estreñimiento).

- Los efectos secundarios por Omeprazol se presentan rara vez en casos aislados.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Auscultar peristaltismo intestinal en casos de ayuno prolongado.
- Administrar medicamentos en horas de la mañana, en ayunas, una vez la persona haya consumido alimento, no es igualmente efectivo el medicamento.
- Valore constantemente si se presentan cambios gastrointestinales en la persona con discapacidad.
- El Omeprazol no resuelve el dolor abdominal, por tanto gestione valoración médica a la persona con discapacidad que persista con este síntoma.

PRESENTACIÓN

LOSARTAN

Tabletas 50 - 100MG

INDICACIONES

Es un antihipertensivo de uso habitual, cuyo mecanismo de acción consiste en bloquear el efecto vasoconstrictor de la Angiotensina II, por tanto, favorece la dilatación de las arterias y con ello la disminución de la tensión arterial. Sus indicaciones son: Hipertensión arterial y coadyuvante en Insuficiencia Cardíaca Congestiva (ICC).

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en personas con falla renal.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Tos, Dolor de pecho .
- Cambios en los niveles de electrolitos (Sodio, Potasio).
- Alteraciones gastrointestinales (náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento).

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Control constante de signos vitales, especialmente tensión arterial.
- No administrar si la Tensión Arterial está por debajo de sus parámetros normales (hipotensión), y consulte con el profesional de enfermería presente.
- NO administrar junto con psicofármacos, pues estos pueden reducir su efecto.

- Garantice controles rutinarios por medicina general, y toma de laboratorios de química sanguínea para determinar si existe alguna alteración hidroelectrolítica.

PRESENTACIÓN

ENALAPRIL

Tabletas 5 - 20MG

INDICACIONES

Es un antihipertensivo de uso habitual, cuyo mecanismo de acción consiste en bloquear el efecto vasoconstrictor de la Angiotensina II, por tanto, favorece la dilatación de las arterias y con ello la disminución de la tensión arterial. Sus indicaciones son: Hipertensión arterial y coadyuvante en Insuficiencia Cardíaca Congestiva (ICC).

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- NO usar en personas con falla renal.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Tos, vértigo, cefalea, hipotensión.
- Cambios en los niveles de electrolitos (Sodio, Potasio).
- Alteraciones gastrointestinales (náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento).

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Control constante de signos vitales, especialmente tensión arterial.
- No administrar si la Tensión Arterial está por debajo de sus parámetros normales (hipotensión), y consulte con el profesional de enfermería presente.
- Garantice controles rutinarios por medicina general, y toma de laboratorios de química sanguínea para determinar si existe alguna alteración hidroelectrolítica.

PRESENTACIÓN

AMLODIPINO

Tabletas 5 - 10MG

INDICACIONES

Es un antihipertensivo de uso habitual, cuyo mecanismo de acción consiste en modular los niveles de Calcio y su efecto en los músculos lisos, por tanto, favorece la dilatación de las arterias y con ello la disminución de la tensión arterial. Sus indicaciones son: Hipertensión arterial, Insuficiencia Cardíaca y Angina.

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en personas con arritmias cardíacas.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Vértigo, cefalea, hipotensión.
- Arritmias cardíacas, bradicardia.
- Alteraciones gastrointestinales (náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento).
- Rubor facial.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Control constante de signos vitales, especialmente tensión arterial.
- No administrar si la Tensión Arterial está por debajo de sus parámetros normales (hipotensión), y consulte con el profesional de enfermería presente.
- Garantice controles rutinarios por medicina general, especialmente si la persona con discapacidad tiene antecedentes cardiovasculares o factores de riesgo agregados para desarrollar enfermedad cardiovascular.

PRESENTACIÓN

METFORMINA

Tabletas 850MG

INDICACIONES

Es un hipoglucemiante, cuyo mecanismo de acción consiste en bloquear la gluconeogénesis en el hígado, de manera que la glucosa circulante pueda ser aprovechada por las células. Está indicado para el tratamiento inicial de la Diabetes Mellitus II.

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en personas con fallo renal.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Vértigo, cefalea.
- Disminución de apetito.
- Alteraciones gastrointestinales (náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento).
- Dolor abdominal.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Control constante de signos vitales.
- Realice control de glucometría antes y después de la ingesta de alimentos.
- No administrar si la glucometría está por debajo de 100 mg /dL. Informe al profesional de enfermería presente.
- Administrar siempre después de que la persona con discapacidad haya consumido alimentos (desayuno- almuerzo), según esté indicado.

PRESENTACIÓN

ACETAMINOFEN

Tabletas 850MG

INDICACIONES

Es un analgésico y antipirético de uso habitual, cuyo mecanismo de acción consiste en disminuir la actividad de las prostaglandinas, encargadas de reaccionar ante agentes externos, ocasionando dolor. Está indicado para manejo de dolor y fiebre, de cualquier etiología

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- NO utilizar en personas con falla hepática.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Linfopenia, eosinofilia, agranulocitosis.
- Erupciones cutáneas.
- Alteraciones gastrointestinales (náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento).
- Dolor abdominal.
- Los efectos secundarios por Acetaminofén se presentan rara vez en casos aislados.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Control constante de signos vitales, especialmente temperatura.
- No administrar si la persona con discapacidad no manifiesta ni presenta dolor o fiebre.
- Garantice controles rutinarios por medicina general, y toma de laboratorios para determinar si hay disminución o aumento en glóbulos blancos

PRESENTACIÓN

LEVOTIROXINA

Tabletas 50 - 75 - 100MCG

INDICACIONES

Es un análogo de la tiroxina, hormona humana. Favorece el gasto de energía y de nutrientes, además regula el aprovechamiento y formación de los lípidos en el cuerpo. Utilizada para el tratamiento de hipotiroidismo y en casos de Tiroidectomía parcial o total.

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Personas que estén en recuperación tras Infarto Agudo del Miocardio.
- Precaución en personas con antecedentes cardiovasculares.
- Puede incrementar el riesgo cardiovascular.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Vértigo, cefalea.
- Diaforesis, palpitaciones, visión borrosa.
- Aumento de apetito
- Ansiedad, debilidad muscular.
- Alteraciones gastrointestinales (náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento).
- Arritmias cardíacas.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Control constante de signos vitales; valore constantemente la frecuencia cardíaca.
- Garantizar controles rutinarios por medicina general para evaluar el riesgo cardiovascular de la persona con discapacidad.
- Realice valoración del estado nutricional, cambios de ingesta y de peso que pueda presentar la persona con discapacidad.

PRESENTACIÓN

HIDRÓXIDO DE ALUMINIO

SUSPENSIÓN 1GR/7.5ML

INDICACIONES

Es un protector gástrico, que neutraliza temporalmente el ácido gástrico, aumentando el pH de este. Está indicado para el tratamiento de: gastritis crónica, dispepsia, úlcera gástrica, úlcera duodenal, esofagitis y reflujo gastroesofágico.

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Hemorragia de vías digestivas altas o bajas.
- Íleo paralítico.
- Impactación fecal u obstrucción intestinal.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Alteraciones gastrointestinales (náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento).
- Los efectos secundarios por Hidríxido de Aluminio se presentan rara vez en casos aislados.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Administrar medicamento preferiblemente antes de la ingesta de alimentos.
- Valore constantemente si se presentan cambios gastrointestinales en la persona con discapacidad.
- El Hidróxido de Aluminio no siempre resuelve el dolor abdominal, por tanto gestione valoración médica a la persona con discapacidad que persista con este síntoma.

PRESENTACIÓN

ATORVASTATINA

Tabletas 20 - 40mg

INDICACIONES

Es un medicamento hipolipemiante, cuyo mecanismo de acción consiste en aumentar, por vía indirecta, el aprovechamiento del colesterol de baja densidad (LDL), en las células, de manera que se reduzcan los niveles de colesterol en sangre. Sus indicaciones son: hipercolesterolemia y coadyudante en manejo posterior al Infarto Agudo de Miocardio (IAM), o falla cardíaca.

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en personas con falla hepática.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Vértigo, cefalea.
- Diaforesis, palpitaciones, visión borrosa.
- Dolor articular o muscular
- Alteraciones gastrointestinales (náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento).
- Urticaria, rash, prurito.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Control constante de signos vitales.
- Garantizar controles rutinarios por medicina general para evaluar el riesgo cardiovascular de la persona con discapacidad y realizar exámenes de laboratorio para determinar la evolución del colesterol en sangre.
- Realice valoración del estado nutricional, cambios de ingesta y de peso que pueda presentar la persona con discapacidad.

PRESENTACIÓN

SALBUTAMOL

Inhalador

INDICACIONES

Es un broncodilatador que actúa en el músculo liso de las vías respiratorias, dilatando y favoreciendo el paso del aire. Sus usos comprenden manejo para: asma bronquial, broncoespasmos asociado a actividad física, reacción alérgica o enfermedad respiratoria.

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en personas arritmias cardíacas.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Temblor.
- Cefalea.
- Taquicardia.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Control constante de signos vitales.
- Utilice inhalo cámara para la administración del medicamento, de manera que pueda garantizar la dosis
- Desinfecte la inhalocámara cada vez que se use.

PRESENTACIÓN

BROMURO DE IPRATROPIO

Inhalador

INDICACIONES

Es un broncodilatador de acción indirecta, que actúa dilatando y favoreciendo el paso del aire en las vías respiratorias. Sus usos comprenden manejo para: asma bronquial, broncoespasmos asociado a enfermedad respiratoria (Ej. EPOC).

CONTRAINDICACIONES

- Alergia al medicamento.
- Precaución en personas arritmias cardíacas.
- Precaución en personas con diagnóstico de hipertensión arterial.

EFECTOS SECUNDARIOS

- Rinitis, tos, rinorrea.
- Cefalea.
- Taquicardia.
- Xerostomía.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

- Control constante de signos vitales.
- Utilice inhalocámara para la administración del medicamento, de manera que pueda garantizar la dosis. Desinfecte la inhalocámara cada vez que se use.

BIBLIOGAFIA

- Ficha técnica Trileptal Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS – CIMA [base de datos en Internet]. Madrid, España: Agencia española de medicamentos y productos sanitarios Disponible en: https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do? metodo=detalleForm

- Fichas técnicas del Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS – CIMA [base de datos en Internet]. Madrid, España: Agencia española de medicamentos y productos sanitarios (AEMPS) - [fecha de acceso 10 marzo 2013]. Disponible en: https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do? metodo=detalleForm 2. L.F.Villa, editor. Medimecum, guía de terapia farmacológica. 16 edición. España: Adis; 2011.

- Nirken MH, et al. Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: Clinical manifestations; pathogenesis; and diagnosis (Síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica: manifestaciones clínicas, patogenia y diagnóstico). http://www.uptodate.com/home. Último acceso: 19 de enero de 2017.

- Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2014. Actualizado: 2016. Definición de: Definición de serotonina (https://definicion.de/serotonina/)

- Sertraline FDA Label. http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/04/briefing/4006b1_06_zoloft-label.pdf

- https://www.vademecum.es/principios-activos-carbamazepina-n03af01

- Enciclopedia médica- MedLine Plus: https://medlineplus.gov/spanish/