Lugar	Servicio Atención Sociosanitaria Transitoria Salud y Vida
Fecha	29 de agosto de 2026 Hora: 1:20pm -1:40pm
Tema	Prevención de errores en la administración de medicamentos
Desarrollo	Objetivo general: *Fortalecer los conocimientos de los auxiliares de enfermería del servicio de Atención Sociosanitaria Transitoria Salud y Vida sobre la correcta manipulación y administración de medicamentos que no deben partirse, triturarse o masticarse, con el fin de prevenir errores de medicación, alteraciones en la acción farmacológica y riesgos para la seguridad de los usuarios.* *Introducción* *Con el fin de prevenir errores en la administración de medicamentos se fortalecen los conocimientos del personal en especial los medicamentos que no se deben partir, triturar o masticar* *Desarrollo del tema* *Primero se agradece la asistencia al espacio a los auxiliares, así mismo se inicia con el tema principal* *¿Cuáles medicamentos NO se deben partir ni triturar?* *Como regla general, no se debe triturar ni partir un medicamento simplemente porque el usuario tenga dificultad para deglutir. Primero debe verificarse la presentación específica y las instrucciones del fabricante o farmacia. Medicamentos de liberación prolongada o modificada* *Son aquellos diseñados para liberar el principio activo lentamente durante varias horas.* *Pueden identificarse con expresiones o siglas como:* • *XR* • *ER* • *SR* • *CR* • *MR* • *LA* • *XL* • *Retard* • *Liberación prolongada* • *Liberación modificada* • *Liberación controlada* • *¿Qué ocurre si se trituran?* *Puede producirse una liberación rápida de una cantidad importante del medicamento, aumentando el riesgo de efectos adversos o toxicidad y disminuyendo la duración esperada del efecto.* *Tabletas con recubrimiento entérico* *Están diseñadas para que el medicamento no se libere en el estómago, sino posteriormente en el intestino.* *Pueden aparecer como:* • *EC* • *EN* • *“Recubierta”* • *“Recubrimiento entérico”* • *“Gastroresistente”* • *Al triturarlas se destruye el recubrimiento y se modifica el lugar donde debe liberarse el medicamento.*

Tabletas sublinguales o bucales
No deben triturarse porque están diseñadas para que el medicamento se absorba a través de la mucosa de la boca.

Tabletas efervescentes
No deben triturarse. Están formuladas para disolverse en agua antes de su administración.

Algunas cápsulas de liberación modificada
Hay cápsulas que contienen gránulos o microesferas diseñadas para liberar el medicamento progresivamente. No deben triturarse los gránulos salvo que el fabricante indique expresamente que pueden abrirse y administrarse de una manera determinada.

Medicamentos peligrosos
Los medicamentos considerados peligrosos, incluidos determinados medicamentos antineoplásicos, no deben triturarse ni partirse sin las medidas de protección y procedimientos establecidos. El polvo generado puede representar un riesgo para el paciente y para el trabajador que lo manipula.

Punto muy importante para los auxiliares

Que una tableta tenga una ranura NO significa automáticamente que pueda partirse. La presencia de una ranura no es suficiente para autorizar la división del medicamento. Se debe verificar la información del producto.

Se termina la sesión agradeciendo su participación y el invitarlos a colocar en práctica la información recibida.



	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia	Firma
Asistentes	**NORMAN FETECUA**	**AUXILIAR DE ENFERMERIA**	**SALUD Y VIDA**	
	JORGE KELIS	**AUXILIAR DE ENFERMERIA**	**SALUD Y VIDA**	
	YURIAN MARROQUIN	**AUXILIAR DE ENFERMERIA**	**SALUD Y VIDA**	
	LEIDY CANDELA	**AUXILIAR DE ENFERMERIA**	**SALUD Y VIDA**	
	YENNY RAMIREZ	**REGENTE DE FARMACIA**	**SDIS / SALUD Y VIDA**	

	Actividad	Responsable	Fecha límite
Compromisos			
Próxima reunión	No aplica		
Elaboró	Yenny Andrea Ramirez- Regente de Farmacia		