Buscar ..




Inicio / Animales de producción / Antibióticos / Oxitetraciclina

La OXITETRACICLINA es un antibiótico en solución inyectable de amplio espectro indicado en el tratamiento de enfermedades infecciosa de bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos, felinos y aves, causadas por microorganismos sensibles a las tetraciclinas

Categorías: Animales de producción, Antibióticos

**Descripción de Producto** **Asesoría Comercial**

| | |
|---|---|
| **INDICACIONES** | La OXITETRACICLINA es un antibiótico en solución inyectable de amplio espectro indicado en el tratamiento de enfer porcinos, ovinos, caninos, felinos y aves, causadas por microorganismos sensibles a las tetraciclinas:<br><br>Anaplasmosis: *Anaplasma marginale*<br><br>Aborto vibriónico: *Campylobacter fetus subs. Veneralis, Campylobacter fetus subs fetus.* |

| | |
|---|---|
| | Enteritis vibriónica: *Campylobacter coli.*<br><br>Carbón sintomático: *Clostridium chauvoei, Clostridium sordelii.*<br><br>Hemoglobinuria bacilar: *Clostridium haemolyticum.*<br><br>Hepatitis necrótica: *Clostridium novyi.*<br><br>Enterotoxemia: *Clostridium perfringens.*<br><br>Edema maligno: *Clostridium septicum.*<br><br>Tétanos: *Clostridium tetani.*<br><br>Leptospirosis: *Leptospira sp.*<br><br>Poliartritis Infecciosa: *Haemophilus parasuis.*<br><br>Coriza infecciosa: *Avibacterium paragallinarum.*<br><br>Hexamitiasis*: Hexamita sp.*<br><br>Listeriosis: *Listeria sp.*<br><br>Pasteurelosis: *Pasteurella sp.*<br><br>Rickettsiosis: *Rickettsia sp.*<br><br>Gurma o adenitis equina: *Streptococcus equi.*<br><br>Neumonía: *Streptococcus pneumoniae* |
| **DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** | **Bovinos, equinos, caprinos, ovinos y porcinos:** 10 mg/kg, en la práctica aplicar 2ml/10kg de peso vivo; en Anaplasmos la práctica 4ml/10kg de peso vivo vía Intramuscular o Intravenosa cada 12 horas por 3 a 5 días.<br><br>**Aves:** 50 mg/kg de peso vivo. Aplicar 1 ml de OXITETRACICLINA /kg de peso vivo aplicada en la pechuga.<br><br>**Perros y gatos:** 6 mg/kg de peso vivo. Aplicar 1,2 ml de OXITETRACICLINA/10 kg de peso vivo vía I.M. |
| **TIEMPO DE RETIRO** | Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.<br><br>La leche producida durante el tratamiento y 6 días después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.<br><br>No administrar a aves ponedoras cuyos huevos sean destinados al consumo humano. |
| **PRECAUCIONES** | Manténgase fuera del alcance de los niños.<br><br>Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Almacenar a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz solar. |
| **PRESENTACIÓN:** | Frasco por 500ml |
| **REGISTRO ICA N°.** | **1177 DB** |

## Productos Relacionados





Doragán®




Enrofloxacina 10




Iverquinos®




Vacuna Encefalitis E

## Empresa Colombiana de Productos Veterinarios

Dirección: Av.Eldorado 82-93-Bogotá,Colombia.
Código Postal: 110931
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 am, a 5:00 pm, jornada continua
Correspondencia y Atención al Ciudadano: Av.Eldorado 82-93-Bogotá,Colombia
Horario de Radicación Correspondencia: Lunes a Viernes de 8:00 am, a 4:00 pm, jornada continua
Teléfono conmutador: +57 601 425 4800
Líneas Gratuitas: Atención Veterinaria: 01 8000 119633 | Atención Agrícola: 01 8000 122437
Correo Institucional: info@vecol.com.co
Correo Notificaciones Judiciales: notificaciones.judiciales@vecol.com.co
Correo de Denuncia: linea.denuncia@vecol.com.co
Formulario para presentar denuncias PTEE y SAGRILAFT
Política de Términos y Condiciones de Uso
Política de Seguridad de la Información
Política de Tratamiento de Datos Personales VECOL S.A
Política de Derechos de Autor y Uso sobre los Contenidos
Política Editorial de la Sede Electrónica
Encuesta de usabilidad

VECOL

GET IT ON Google Play App Store