



ANEXO No. OFRECIMIENTO ECONOMICO

OBJETO:

ITEMS	PRODUCTO	PRESENTACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO EN LOS CASOS QUE APLICA)
1	Insecticida organofosforado - Pirimifos-metil Concentración: Insecticida organofosforados 500 gr/l de Pirimifos metil Concentrado Emulsionable	Envases PET /1 Litro	El insecticida organofosforado (adulticida) para uso en salud pública a emplear, en el marco del Decreto 1843 de 1991, la Guía Entomológica para el control del Dengue y WHOPES, para este tipo de intervenciones el cual es empleado para fumigación espacial a Ultra Bajo Volumen ULV, para el control del vector adulto de Aedes aegypti durante brotes epidémicos en áreas abiertas y son degradados rápidamente en el ambiente, hace mucho más difícil que una población de mosquitos Ae. Aegypti puedan generar una resistencia.	1	
2	Larvicida organofosforado Concentración: 1% (p/p)	Bolsa de 25 Kilos	Larvicida Temephos, es un insecticida organofosforado, el cual combate las larvas en sus diferentes estadios; al alimentarse en el criadero filtran el agua saturada del activo, causando la muerte del 100% de larvas, por su mecanismo inhibidor de la enzima acetilcolinesterasa.	1	
3	Bacillus sphaericus Concentración: Bacillus sphaericus 236	Potes 500 gramos	Su actividad larvicida se debe a la producción de una inclusión cristalina denominada toxina binaria, respectivamente, las cuales, al ser liberadas en el intestino de los insectos susceptibles en su fase larvaria y tras ser solubilizada por el pH alcalino en la porción media del intestino, activan las proteasas causando deshidratación y muerte a los vectores. Biolarvicida altamente potencial y eficaz para el control biológico de Anopheles spp., Aedes spp. Y Culex spp.	1	
4	Permetrina 55% Concentración emulsionable	Frasco por 1 litro	Los adulticida piretroides actúan sobre la membrana plasmática de las neuronas del insecto, provocando un retraso en el cierre de los canales de sodio (voltaje dependientes) y son considerados altamente tóxicos para los mosquitos, con escaso efecto sobre los mamíferos. Estas propiedades, así como la utilización de dosis reducidas durante su aplicación, la corta persistencia y escasa bioacumulación en el ambiente, permiten su utilización en el control del vector. La degradación es rápida en el suelo y en el agua. Se le considera fotoestable en comparación con otros piretroides sintéticos. Se considera ligeramente persistente: 4 semanas. Permost VPM 55% EC ha sido inscrito en la Organización Mundial de la Salud bajo el código WHO/331/TC para el ingrediente activo y WHO/331/EC para el producto formulado en concentración emulsionable.	1	
VALOR TOTAL					

Valor en letras:

Firma del proponente
Nombre
NIT