Alka-Seltzer
Original Flavor

Información del medicamento

Principio activo (en cada comprimido) Proposito
Aspirina tamponada 325 mg (AINE)…Analgésico/antipirético
* fármaco antiinflamatorio no esteroideo

Usos
- alivia temporalmente dolores y molestias leves debidos a:
  - Dolor de cabeza • dolor muscular • Dolor de espalda
  - Dolor de muela • Dolor menstrual • Resfriados
  - Dolor leve de artritis
- Reduce temporalmente la fiebre

Advertencias:
Síndrome de Reye: Los niños y adolescentes que tienen o se están recuperando de varicela o síntomas similares a los de la gripe no deben usar este producto. Si durante el uso de este producto se producen cambios en el comportamiento acompañados de náuseas y vómitos, consulte a un médico, ya que estos síntomas podrían ser una señal temprana del síndrome de Reye, una enfermedad rara pero grave.
Alerta de alergia: La aspirina puede causar una reacción alérgica grave que puede incluir:
• Urticaria • Hinchazón facial • Asma (sibilancias) • shock
Advertencia de sangrado estomacal: Este producto contiene un AINE, que puede causar sangrado grave. La probabilidad es mayor si usted
- Tiene 60 años o más
- Ha tenido úlceras estomacales o problemas de sangrado
- Toma un medicamento anticoagulante o esteroides
- Toma otros medicamentos que contienen AINE (con o sin receta) (aspirina, ibuprofeno, naproxeno u otros)
- Consume 3 o más bebidas alcohólicas al día mientras usa este producto
- Toma una dosis mayor o durante más tiempo del indicado

No lo use
- Si es alérgico a la aspirina o a cualquier otro analgésico
- Si alguna vez ha tenido una reacción alérgica a este producto o a cualquiera de sus ingredientes

Consulte a un médico antes de usarlo si
- Se aplica a usted la advertencia de sangrado estomacal
- Tiene antecedentes de problemas estomacales, como acidez
- Tiene presión arterial alta, enfermedad cardíaca, cirrosis hepática o enfermedad renal
- Está tomando un diurético
- Tiene asma
- Sigue una dieta restringida en sodio

Consulte a un médico o farmacéutico antes de usarlo si está tomando un medicamento recetado para
- Diabetes • Gota • Artitris

Suspenda su uso y consulte a un médico si
- Se produce una reacción alérgica. Busque ayuda médica de inmediato.
- Presenta alguno de los siguientes signos de sangrado estomacal:
  - Desmayo • Vómito con sangre • Heces con sangre

Alka-Seltzer
Original Flavor

- Dolor de estómago que no mejora
- El dolor empeora o dura más de 10 días
- La fiebre empeora o dura más de 3 días
- Enrojecimiento o hinchazón
- Aparición de nuevos síntomas
- Zumbido en los oídos o pérdida de audición

Si está embarazada o en período de lactancia, consulte a un profesional de la salud antes de usar este medicamento. **Es especialmente importante no usar aspirina a partir de las 20 semanas de embarazo, a menos que un médico se lo indique expresamente, ya que puede causar problemas en el feto o complicaciones durante el parto. Manténgase fuera del alcance de los niños.**

Instrucciones

- Disuelva completamente 2 tabletas en 120 ml de agua antes de tomarlas

adultos y niños de 12 años en adelante	2 comprimidos cada 4 horas, o según las indicaciones medicas	No exceda las 8 tabletas en 24
adultos de 60 años en	2 comprimidos cada 4 horas, o según las indicaciones del médico.	No exceda los 4 comprimidos en 24 horas.
Niños menores de 12 años.		

Otra información

- **Cada comprimido contiene:** 568 mg de sodio
- Conservar a temperatura ambiente. Evitar el calor excesivo.
- Alka-Seltzer Original disuelto en agua, contiene principalmente el analgésico acetil salicilato de sodio.

Ingredientes inactivos: Ácido cítrico anhidro, bicarbonato de sodio

¿Preguntas o comentarios? **1-800-986-0369** (Lun - Vie 9AM - 5PM EST)