FICHA TÉCNICA CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Nombre del Producto :	LAGRIFRESH SOL. OFTAL. FCO x 15ml	
Molécula y concentración :	HIDROXIPROPILMETILCEL 3mg+DEXTRAN 70 1mg	
Forma Farmaceutica :	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	
Presentación :	FRASCO X 15 ML	
Código Interno Procaps :	300000057	
Fabricante :	PHARMAYECT S.A.	
Modalidad Registro Sanitario :	FABRICAR Y VENDER	
Código CUM :	19937169-2	
No. Registro INVIMA :	INVIMA 2019M-0002724-R2	**Vence :** 25.09.2024
Vida útil del producto:	2 años	
EAN 13 :	7703153008147	**EAN 14 :** N.A

ENVASE	**Tipo :**	FRASCO
	Material :	FRASCO PEBD
	Cantidad Contenida por Unidad Mínima de Despacho :	1 FRASCO X 15 ML

EMPAQUE	**Tipo :**	CAJA PLEGADIZA
	Material :	CARTON
	Cantidad Contenida :	FRASCO X 15 ML
	Dimensiones del empaque :	LARGO: 45 +- 1 mm; ANCHO: 30 +- 1 mm; ALTO: 86 +- 1 mm

PESO	**Plegadiza vacia :**	3,000 G
	Peso neto :	22,000 G
	Peso Bruto :	25,000 G

UNIDAD DE SUB-EMPAQUE CORRUGADA	**Unidades por Corrugada :**	84 UND
	Dimensiones de la Corrugada :	LARGO: 335 +- 3 mm; ANCHO: 202 +- 3 mm; ALTO: 180 +- 3 mm

El producto tiene IVA ?	NO
Condiciones especiales de Almacenamiento :	ALMACENAR A TEMPERATURA NO MAYOR A 30°C.
Requiere Cadena de Frío ?	NO
Codigo ATC :	S01XA20
Sistema Orgánico :	ORGANOS DE LOS SENTIDOS.
Grupo Farmacológico :	OFTALMOLOGICOS
Subgrupo Farmacológico :	OTROS OFTALMOLOGICOS
Subgrupo Químico :	OTROS OFTALMOLOGICOS.
Via de administración :	CONJUNTIVAL
Indicaciones :	PARA ALIVIO TEMPORAL DE LAS MOLESTIAS POR IRRITACIONES LEVES DEL OJO, PROVOCADAS POR LA EXPOSICIÓN AL VIENTO, SOL Y OTROS IRRITANTES. PARA PROTEGER CONTRA NUEVAS IRRITACIONES O ALIVIAR LA SEQUEDAD DEL OJO.

DOCUMENTO PROPIEDAD DE PROCAPS S.A. - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL.

FICHA TÉCNICA CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Contraindicaciones y advertencias :	HIPERSENSIBILIDAD A LOS COMPONENTES. PARA EVITAR CONTAMINACIÓN NO TOQUE NI PONGA EN CONTACTO LA PUNTA DEL DISPENSADOR CON LA ZONA AFECTADA. EL PRESERVANTE CLORURO DE BENZALCONIO PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN, PUEDE DEPOSITARSE EN LOS LENTES DE CONTACTO BLANDOS, ESTOS DEBEN COLOCARSE 15 MINUTOS DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL MEDICAMENTO. EVITE EL CONTACTO CON LENTES DE CONTACTO BLANDOS. REMUEVA LOS LENTES DE CONTACTO, ANTES DE LA APLICACIÓN Y ESPERE AL MENOS, 15 MINUTOS ANTES DE LA INSERCIÓN. ALTERA EL COLOR DE LOS LENTES DE CONTACTO BLANDOS.

DOCUMENTO PROPIEDAD DE PROCAPS S.A. - PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL.