MELOXICAM 15 MG TABLETAS.	
Código Producto:	74252 CAJA X 10 TAB
	468565 CAJA X 10 TAB MMED
	710741 CAJA X 10 TAB INST

Datos Farmacéuticos	
Registro Sanitario	**Titular Registro Sanitario**
INVIMA 2020M-14443-R2	LABORATORIOS MK S.A.S., Carrera 6 Nro. 23 – 30, CALI- VALLE
Compuesto Activo	**Fabricante**
MELOXICAM	TECNOQUIMICAS S.A. PLANTA JAMUNDI, KM 23 VÍA CALI-JAMUNDÍ, JAMUNDÍ- VALLE
Forma Farmacéutica	**Modalidad del Registro Sanitario**
TABLETAS	FABRICAR Y VENDER

Especificaciones de Calidad según Método TAB-252	
ENSAYO	**ESPECIFICACIÓN**
DESCRIPCIÓN	TABLETAS CIRCULARES DE COLOR AMARILLO PÁLIDO, CON LOGO TQ EN UNA CARA, RANURA CENTRAL EN LA OTRA
DESINTEGRACIÓN	MÁXIMO 15 MINUTOS
UNIFORMIDAD DE DOSIS (UNIF. DE CONT.) Media tableta	CUMPLE CRITERIO USP
DISOLUCIÓN	MÍNIMO 70% (Q) EN 30 MINUTOS
ENSAYO Meloxicam (USP VIGENTE)	13.5mg/TAB - 16.5mg/TAB
ENSAYO Meloxicam (USP VIGENTE)	90.0% - 110.0%

Información General	
Material de Envase y Empaque	**Presentación Comercial**
Empaque Primario: BLISTER PVdC	CAJA POR 10 TABLETAS
Empaque Secundario: PLEGADIZA	
Instrucciones de Uso	**Vía de administración**
SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA	ORAL

Datos Clínicos	
Indicaciones	**Contraindicaciones y Advertencias**
ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDE, INDICADO EN TRATAMIENTO SINTOMÁTICO DE ARTRITIS REUMATOIDE, EN OSTEOARTRITIS DOLOROSA (ARTROSIS, ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA).	HIPERSENSIBILIDAD AL PRINCIPIO ACTIVO O A CUALQUIERA DE SUS COMPONENTES. MENORES DE 18 AÑOS. REACCIONES ALÉRGICAS AL ÁCIDO ACETILSALICÍLICO U OTROS AINES. BRONCOESPASMO, RINITIS AGUDA, PÓLIPOS NASALES Y EDEMA ANGIONEURÓTICO. ULCERA PÉPTICA, SANGRADO GASTROINTESTINAL Y ANTECEDENTE DE ENFERMEDAD ACIDO-PÉPTICA. DISFUNCIÓN HEPÁTICA MODERADA Y SEVERA. INSUFICIENCIA RENAL GRAVE (DEPURACIÓN DE CREATININA <30ML/MIN). EMBARAZO EN ESPECIAL EN EL TERCER TRIMESTRE, LACTANCIA. CONTRAINDICADOS EN PACIENTES CON ANTECEDENTES DE: CIRUGÍA DE DERIVACIÓN ARTERIAL CORONARIA (BYPASS), DISFUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA,

	HIPERTENSIÓN, INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA SEVERA Y ENFERMEDAD CORONARIA, ENFERMEDAD ISQUÉMICA MIOCÁRDICA E ISQUÉMICA CEREBROVASCULAR. ADMINISTRAR CON PRECAUCIÓN EN PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR COMO: HIPERLIPIDEMIA, DIABETES, ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA Y CONSUMO DE CIGARRILLO. EL USO CONCOMITANTE CON EL ACIDO ACETILSALICÍLICO (ASA) INCREMENTA EL RIESGO DE ULCERA GASTROINTESTINAL Y SUS COMPLICACIONES. SE RECOMIENDA QUE DEBE UTILIZARSE POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA CON LA MENOR DOSIS TERAPÉUTICA Y POR EL MENOR TIEMPO REQUERIDO
Condiciones de Almacenamiento	**Precauciones**
ALMACENAR A TEMPERATURA INFERIOR A 30°C. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.	N/A