INDICACIONES:
Procedimientos oftálmicos en los cuales se requiere una anestesia tópica rápido y de corta duración.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS:
Hipersensibilidad al medicamento, el preservante Cloruro de Benzalconio puede depositarse en los lentes de contacto blandos, deben colocarse 15 minutos después de la aplicación del fármaco.

USO TRAS APERTURA:
Una vez abierto el producto utilice por 28 días y deseche el líquido sobrante.

POSOLOGÍA:
Según criterio del médico.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperatura no mayor a 30°C, en su envase y empaque originales.

REGISTRO SANITARIO NO:
INVIMA 2022M-011419-R4

TITULAR:
OFTALMOQUIMICA S.A.

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:
Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación.

CONTROL DE CAMBIOS:

Revisión 002. Actualización por vigencia del documento, y por producto en trámite de renovación.

Revisión 003. Actualización por modificación de registro sanitario.

HeleraCn
OFTALMOQUIMICA
APROBADO

Oftalmo Química S.A.	FICHA TÉCNICA OQ – SEINA	
CÓD.: ESP. – 104 REVISIÓN: 004	F. APLICACIÓN: 10/2022 F. REVISIÓN: 10/2025	PAGINA 1 DE 2

BENOXINATO CLORHIDRATO 4.0 mg.

NOMBRE COMERCIAL:
OQ-Seina ®

COMPOSICIÓN:
Cada mL (25 gotas) contiene Benoxinato Clorhidrato 4.0 mg.



PRESENTACIÓN:
Caja con un frasco gotero de PEBD blanco x 15mL provisto de su respectiva subtapa capilar en Alathon color natural y tapa con anillo en polipropileno blanca.

EMPAQUE:
Caja con frasco gotero.

FORMA FARMACÉUTICA:
Solución oftálmica.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:
Oftálmica.

HelenaCM
OFTALMOQUIMICA
APROBADO