BAYCUTEN N CREMA

Clotrimazol 1 g/ Dexametasona Acetato equivalente a Dexametasona Base 0.04 g/ Neomicina Sulfato equivalente a Neomicina Base 0.5 g

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN:
Cada 100 g de crema contiene **Clotrimazol 1 g, Dexametasona Acetato Equivalente A Dexametasona Base 0.04 g, Neomicina Sulfato equivalente a Neomicina Base 0.5 g.**

FORMA FARMACÉUTICA:
Crema tópica

VIA DE ADMINISTRACION:
Tópica (externa)

CUM / PRESENTACIÓN COMERCIAL:
25941-04 / Tubo colapsible por 10 g.

25941-05 / Tubo colapsible por 20 g.

25941-06 / Tubo colapsible por 35 g.

MATERIAL DE ENVASE:
Tubo colapsible

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:
2 años

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar a temperaturas no mayores de 30°C en su envase y empaques originales.

INFORMACIÓN FARMACOLÓGICA

INDICACIONES:
Dermatitis causada por gérmenes sensibles al Clotrimazol y a la Neomicina, como: dermatitis que cursan con infección bacteriana secundaria, dermatitis complicadas por infecciones causadas por dermatofitos, levadura, mohos y otros hongos, eczemas de diversas etiologías, tanto primarios como complicados de infección bacteriana y/o micótica secundaria.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los componentes, lesiones tuberculosas y virales de la piel.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Durante el embarazo, particularmente en el primer trimestre, así como durante la lactancia, BAYCUTEN® N, al igual que todos los productos que contienen corticoesteroides, debe usarse sólo cuando la indicación ha sido bien establecida, por períodos cortos y no en superficies amplias. Uso pediátrico. - Se aconseja no utilizar pañales desechables o calzoncitos de plástico durante el tratamiento, ya que pueden actuar como cubiertas oclusivas. Puede producir reacciones de rebote (al suspender la medicación brusca y prematuramente pueden presentarse las mismas afecciones que indicaron su uso). Gestación y lactancia. No se debe utilizar concomitantemente con una cubierta oclusiva en pacientes con eczema atópico. No se aplique en los ojos. No se han reportado hasta la fecha efectos de carcinogénesis, mutagénesis o teratogénesis con la aplicación local de dexametasona, clotrimazol y/o neomicina. Así mismo, no se conocen alteraciones de la fertilidad con esta forma de administración.

EVENTOS ADVERSOS:
Ocasionalmente irritaciones cutáneas; acné por esteroides, telangiectasias, hipertricosis, dermatrofia, estrías cutáneas. El tratamiento a largo plazo con corticoesteroides y antibióticos locales debe evitarse.

PRODUCTO BAJO PRESCRIPCION MÉDICA.

Basado en CCDS No. 1

Para mayor información consulte nuestros textos más detallados

RESTRICTED

INFORMACIÓN GENERAL

FABRICADO POR:
Bayer De México S.A. De C.V., Estado De Veracruz, México
Bayer S.A Venezuela, La trinidad - municipio Baruta, Venezuela

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: Bayer S.A., Colombia

No. REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2017M-008385-R3

VERIFICADO POR: Asuntos Regulatorios

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Agosto 2020

RESTRICTED